

Бекарбон



Код АТХ:

- [A03BA04](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Белладонны листьев экстракт](#)
- [Натрия гидрокарбонат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Вегетотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает спазмолитическое и антацидное действие.

Белладонна оказывает спазмолитическое (м-холиноблокирующее) действие. Препятствует стимулирующему действию ацетилхолина; уменьшает секрецию слюнных, желудочных, бронхиальных, слезных, потовых желез, поджелудочной железы. Снижает тонус мышц ЖКТ, желчных протоков и желчного пузыря; вызывает тахикардию, улучшает АВ-проводимость. Расширяет зрачки, затрудняет отток внутриглазной жидкости, повышает внутриглазное давление, вызывает паралич аккомодации.

Натрия гидрокарбонат при приеме внутрь взаимодействует с соляной кислотой желудочного сока, нейтрализуя ее. Увеличивает выведение натрия и хлора, осмотический диурез, сдвигает в щелочную сторону реакцию бронхиальной слизи, повышает бронхиальную секрецию, делает мокроту менее вязкой, улучшает ее отхаркивание.

Показания к применению:

- кишечная колика;
- гиперацидный гастрит;
- изжога;
- диспепсия.

Относится к болезням:

- [Диспепсия](#)
- [Изжога](#)
- [Кишечная колика](#)
- [Кишечные колики](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- закрытоугольная глаукома;
- гипертрофия предстательной железы с нарушением оттока мочи.

Способ применения и дозы:

Внутрь, за 30-40 мин до еды, по 1 таб. 2-3 раза/сут.

Высшая разовая доза для **взрослых** - 5 таб., высшая суточная доза - 15 таб.

Побочное действие:

Сухость во рту, жажда, атония кишечника, задержка мочи, тахикардия, мидриаз, парез аккомодации.

Передозировка:

Симптомы: психомоторное возбуждение, судороги, парез аккомодации, острая задержка мочи.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций и хорошего зрения.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Bekarbon>