Беллацехол



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые оболочкой желтого цвета, двояковыпуклой формы.

	1 таб.
сумма алкалоидов красавки	150 мкг
танацехол (с содержанием суммы флавоноидов и фенолкарбоновых кислот в пересчете на лютеин и сухое вещество 50%)	50 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал картофельный, кальция стеарат, аэросил А-380.

Состав оболочки: сахар, желатин, аэросил А-380, магния гидроксикарбонат, титана диоксид, тропеолин-О.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
30 шт. - банки темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Вегетотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Обладает противоязвенным действием за счет вагусной блокады желудочной секреции со спазмолитическим, анальгезирующим и репаративным действием. Нормализует функциональную активность печени, стимулирует желчеотделение, улучшает биохимический состав желчи.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Беллацехол не предоставлены.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

— обострение хронического гастрита и/или гастродуоденита (в т.ч. с эрозивно-язвенными изменениями);

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, сочетающиеся с хроническим холециститом, гипомоторной дискинезией желчевыводящих путей.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Гастродуоденит
- Холера
- Холецистит
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

— глаукома;

— аденома предстательной железы;

— тахиаритмия;

— тиреотоксикоз;

— сердечная недостаточность;

— стеноз привратника;

— желчнокаменная болезнь;

— беременность;

— период лактации (грудное вскармливание);

— детский и подростковый возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 1 таб. 3 раза/сут, за 20-30 мин до еды. В случае необходимости и при хорошей переносимости возможно увеличение суточной дозы до 6 таб. Длительность определяется врачом индивидуально и, как правило, составляет 3-4 нед.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, сухость во рту.

При применении в высоких дозах: нарушение аккомодации, затруднение мочеиспускания.

Передозировка:

Симптомы: сухость во рту, жажда, запор, ощущение сердцебиения, мидриаз, преходящее нарушение зрения, светобоязнь, гиперемия кожи, атония кишечника, задержка мочеиспускания, головная боль, головокружение, повышение температуры тела; в редких случаях - психомоторное возбуждение, судороги.

Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Ослабляет действие м-холиномиметиков и антихолинэстеразных лекарственных средств.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказание — детский и подростковый возраст до 18 лет.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bellacehol