

## Беллацехол



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Таблетки, покрытые оболочкой** желтого цвета, двояковыпуклой формы.

	<b>1 таб.</b>
сумма алкалоидов красавки	150 мкг
ганацехол (с содержанием суммы флавоноидов и фенолкарбоновых кислот в пересчете на лютеин и сухое вещество 50%)	50 мг

*Вспомогательные вещества:* лактоза, крахмал картофельный, кальция стеарат, аэросил А-380.

*Состав оболочки:* сахар, желатин, аэросил А-380, магния гидроксикарбонат, титана диоксид, тропеолин-О.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

30 шт. - банки темного стекла (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Вегетотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат. Обладает противоязвенным действием за счет вагусной блокады желудочной секреции со спазмолитическим, анальгезирующим и репаративным действием. Нормализует функциональную активность печени, стимулирует желчеотделение, улучшает биохимический состав желчи.

#### **Фармакокинетика**

Данные по фармакокинетике препарата Беллацехол не предоставлены.

### Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

— обострение хронического гастрита и/или гастродуоденита (в т.ч. с эрозивно-язвенными изменениями);

## Беллацехол

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, сочетающиеся с хроническим холециститом, гипомоторной дискинезией желчевыводящих путей.

### Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Гастродуоденит](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

### Противопоказания:

- глаукома;
- аденома предстательной железы;
- тахикардия;
- тиреотоксикоз;
- сердечная недостаточность;
- стеноз привратника;
- желчнокаменная болезнь;
- беременность;
- период лактации (грудное вскармливание);
- детский и подростковый возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

Внутрь, по 1 таб. 3 раза/сут, за 20-30 мин до еды. В случае необходимости и при хорошей переносимости возможно увеличение суточной дозы до 6 таб. Длительность определяется врачом индивидуально и, как правило, составляет 3-4 нед.

### Побочное действие:

*Возможно:* аллергические реакции, сухость во рту.

*При применении в высоких дозах:* нарушение аккомодации, затруднение мочеиспускания.

### Передозировка:

*Симптомы:* сухость во рту, жажда, запор, ощущение сердцебиения, мидриаз, преходящее нарушение зрения, светобоязнь, гиперемия кожи, атония кишечника, задержка мочеиспускания, головная боль, головокружение, повышение температуры тела; в редких случаях - психомоторное возбуждение, судороги.

*Лечение:* промывание желудка, симптоматическая терапия.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Ослабляет действие м-холиномиметиков и антихолинэстеразных лекарственных средств.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказание — детский и подростковый возраст до 18 лет.

## **Условия хранения:**

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Bellacehol>