

Беллатаминал



Код АТХ:

- [N05CB02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Белладонны алкалоиды](#)
- [Фенобарбитал](#)
- [Эрготамин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые оболочкой светло-желтого цвета, двояковыпуклой формы.

	1 таб.
красавки сумма алкалоидов	100 мкг
эрготамин тартрат	300 мкг
фенобарбитал	20 мг

Вспомогательные вещества: сахар-рафинад, крахмал картофельный, повидон (поливинилпирролидон), кальция стеарат (кальций стеариновоокислый).

Состав оболочки: сахар-рафинад, кремний диоксид коллоидный (Аэросил А-380), магния гидроксикарбонат (магния карбонат основной), титана диоксид (титана двуокись), желатин, воск пчелиный, тропеолин О.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.
30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
50 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Обладает альфа-адреноблокирующим, м-холиноблокирующим и седативным действием.

Показания к применению:

- повышенная раздражительность;
- бессонница;
- неврогенные расстройства менструального цикла;
- нейродермит (для облегчения зуда);
- вегето-сосудистая дистония (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- [Вегето-сосудистая дистония](#)
- [Зуд](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Нейродермит](#)

Противопоказания:

- стенокардия и другие выраженные проявления атеросклероза;
- спазм периферических артерий;
- закрытоугольная глаукома;
- беременность;
- грудное вскармливание;
- роды;
- возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь по 1 таб. 2-3 раза/сут после еды. Продолжительность применения препарата составляет от 2 до 4 недель. Возможно проведение повторных курсов лечения после консультации с врачом.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, сухость во рту, сонливость, парез аккомодации.

Передозировка:

Симптомы: головокружение, вялость, сонливость, тахикардия, расширение зрачков, нарушение аккомодации, затруднение мочеиспускания, атония кишечника, судороги, в тяжелых случаях - ступор, кома.

Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, проведение симптоматической терапии.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Действие препарата усиливают альфа- и бета-адреномиметики, никотин.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций и хорошего зрения.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Bellataminal>