Белосалик лосьон



Код АТХ:

- D07XC01

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бетаметазон
- Салициловая кислота

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для наружного применения*** прозрачный, бесцветный, вязкий, с запахом изопропанола.

	1 г
бетаметазона дипропионат	640 мкг,
что соответствует содержанию бетаметазона	500 мкг
салициловая кислота	20 мг

Вспомогательные вещества: динатрия эдетат - 0.3 мг, гипромеллоза 4000 сПз - 5 мг, натрия гидроксид - 5 мг, изопропанол - 392 мг, вода - 577.06 мг.

50 мл - флаконы из полиэтилена высокой плотности с капельницей (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы из полиэтилена высокой плотности с капельницей (1) - пачки картонные.
20 мл - флаконы из полиэтилена высокой плотности с распыляющим помповым механизмом (1) в комплекте с пластиковой насадкой-распылителем - пачки картонные.
50 мл - флаконы из полиэтилена высокой плотности с распыляющим помповым механизмом (1) в комплекте с пластиковой насадкой-распылителем - пачки картонные.
100 мл - флаконы из полиэтилена высокой плотности с распыляющим помповым механизмом (1) в комплекте с пластиковой насадкой-распылителем - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Гормоны и их антагонисты

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат для наружного применения. Белосалик лосьон оказывает противовоспалительное, противозудное, противоотечное, противоаллергическое, антипролиферативное, иммунодепрессивное, кератолитическое, противомикробное, противогрибковое действие.

Бетаметазона дипропионат - синтетический ГКС, оказывающий противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное и сосудосуживающее действие. При нанесении на поверхность кожи суживает сосуды, снимает зуд, снижает выделение медиаторов воспаления (из эозинофилов и тучных клеток), интерлейкинов 1 и 2, гамма-интерферона (из лимфоцитов и макрофагов), тормозит активность гиалуронидазы и понижает проницаемость сосудистой стенки. Взаимодействует со специфическими рецепторами в цитоплазме клетки, стимулирует синтез мРНК, индуцирующей образование белков, в том числе липокортина, опосредующих клеточные эффекты. Липокортин угнетает фосфолипазу A_2, блокирует высвобождение арахидоновой кислоты и биосинтез эндоперекисей, простагландинов, лейкотриенов (способствующих развитию воспаления, аллергии и других патологических процессов).

Салициловая кислота за счет кератолитического действия очищает участки поражения от чешуек, способствует проникновению бетаметазона в кожу, поддерживает кислую среду кожи, предупреждая развитие бактериальной и грибковой инфекции.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Белосалик лосьон не предоставлены.

Показания к применению:

Подострые и хронические дерматозы, чувствительные к терапии ГКС, и сопровождающиеся гиперкератозом и шелушением:

— псориаз;

— себорея;

— себорейный дерматит (волосистой части головы);

— асбестовидный лишай;

— нейродермит;

— красный плоский лишай с локализацией на волосистой части головы;

— экзема;

— дисгидроз кожи;

— ихтиоз.

Относится к болезням:

- Дерматит
- Ихтиоз
- Кератит
- Лишай
- Нейродермит
- Себорея
- Экзема

Противопоказания:

— туберкулез кожи;

— кожные проявления сифилиса;

— ветряная оспа;

— вирусные инфекции кожи;

— кожные поствакцинальные реакции;

— открытые раны;

— трофические язвы;

— розацеа;

— вульгарные угри;

— детский возраст до 6 мес;

— повышенная чувствительность к бетаметазону, салициловой кислоте или к любому из вспомогательных компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат предназначен для наружного применения.

Несколько капель раствора для наружного применения равномерно распределяют по поверхности кожи, слегка втирая. Кратность применения – 2 раза/сут, в *легких случаях* достаточно однократного использования.

Продолжительность непрерывного курса лечения, как правило, ограничивается 3-4 неделями. При необходимости более длительного курса терапии рекомендуется препарат использовать реже, например, через день.

Препарат можно назначать с осторожностью **детям с 6 мес** и на максимально короткий срок.

Побочное действие:

Побочные явления, как правило, обратимы и носят слабовыраженный характер.

Со стороны кожных покровов: возможно развитие реакций гиперчувствительности (зуд, жжение, гиперемия), акнеподобные изменения, гипопигментация, стрии, атрофия кожи, гипертрихоз, вторичные инфекции кожи.

При длительном непрерывном бесконтрольном применении и при нанесении на большие участки кожи: телеангиэктазии, системные проявления побочных действий ГКС или салицилатов.

При развитии реакции гиперчувствительности или побочных реакций препарат следует отменить и обратиться к врачу.

Передозировка:

Симптомы: проявление системных побочных эффектов.

Лечение: рекомендуется отмена препарата и симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата Белосалик лосьон у беременных допускается в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает риск для плода. В таких случаях применение препарата должно быть непродолжительным и ограничиваться небольшими участками кожных покровов.

В период грудного вскармливания применение препарата Белосалик лосьон возможно по строгим показаниям, но при этом препарат нельзя наносить на кожу молочной железы перед кормлением.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не отмечено клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными средствами.

Одновременное использование косметических и дерматологических средств для наружного применения, содержащих этанол, или медицинского мыла с выраженным подсушивающим эффектом, может вызвать раздражение кожи.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат предназначен только для наружного применения.

Следует избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки, а также применения препарата в аногенитальной области.

Не рекомендуется применение препарата под окклюзионной повязкой, за исключением случаев, когда это необходимо.

При развитии грибковой или бактериальной микрофлоры на коже, необходимо дополнительное применение антибактериального или противогрибкового средства.

Препарат Белосалик лосьон в форме раствора для наружного применения особенно удобен для использования на коже волосистой части головы. Раствор легко распределяется по поверхности кожи, не склеивает и не высушивает волосы, не оставляет видимых следов, оказывает охлаждающее действие на кожу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Данных о неблагоприятном воздействии препарата Белосалик лосьон на способность управлять транспортными средствами и механизмами не имеется.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 6 мес.

Применение препарата Белосалик у детей должно быть как можно менее продолжительным при соблюдении строгих мер предосторожности, т.к. у детей существует опасность системного всасывания пропорционально большего количества активных компонентов из-за преобладания площади кожных покровов над массой тела и недостаточной зрелости эпидермиса. Не следует применять препарат у детей под повязки и, особенно под пластифицированные подгузники, что может увеличить риск развития нежелательных явлений.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Belosalik_loson