Бемилон



Код АТХ:

- D07BC01

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бетаметазон
- Хлоргексидин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Крем для наружного применения	**1 г**
бетаметазон (в форме валерата)	1 мг
хлоргексидина биглюконат	5 мг

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Гормоны и их антагонисты
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Бетаметазон - глюкокортикостероид, оказывает местное противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное, противоотечное и антипролиферативное действие. Обладает более сильным вазоконстрикторным действием, чем другие фторпроизводные глюкокортикостероидов, системные эффекты выражены незначительно из-за ограниченного всасывания через кожные покровы. При воздействии на кожу происходит предупреждение краевого скопления нейтрофилов, что приводит к уменьшению экссудации, продукции цитокинов, торможению миграции макрофагов, приводящее в конечном итоге к уменьшению процессов инфильтрации и грануляции.

Хлоргексидин - противомикробный препарат, действующий на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, дрожжи, дерматофиты.

Показания к применению:

Воспалительные и аллергические дерматозы, осложненные вторичным инфицированием и профилактика вторичного инфицирования:

— псориаз;

— парапсориаз;

— липоидный некробиоз;

— контактный дерматит;

— атопический дерматит;

— экземы;

— нейродермит;

— себорейный дерматит;

— эритродермия -кольцевидная эритема;

— узловатая эритема;

— лимфоцитома;

— доброкачественная лимфоплазия;

— красный плоский лишай -пруриго;

— флеботодермия;

— эксфолиативный дерматит;

— герпетиформный дерматит;

— радиационный дерматит;

— дискоидная красная волчанка;

— кожный зуд различной этиологии (в т.ч. зуд заднего прохода и наружных половых органов, старческий зуд).

Относится к болезням:

- Аллергия
- Волчанка
- Герпес
- Дерматит
- Зуд
- Лимфома
- Липома
- Лишай
- Нейродермит
- Псориаз
- Себорея
- Узловатая эритема
- Флебит
- Флеботодермия
- Экзема
- Эритема

Противопоказания:

— кожные проявления сифилиса;

— туберкулез кожи;

— вирусные поражения кожи;

— трофические язвы голени, связанные с варикозным расширением вен;

— новообразования кожи;

— розацеа, вульгарные угри, поствакцинальные кожные реакции;

— у детей до 1 года - сыпь (на фоне опрелости);

— гиперчувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: при длительном применении или нанесении на большие поверхности - катаракта, сахарный диабет, глаукома, туберкулез.

Способ применения и дозы:

Наружно. Крем наносят тонким слоем, втирая, на пораженные участки кожи 2-3 раза/сут; в легких случаях — 1 раз/сут. В случаях, трудно поддающихся лечению, возможно применение окклюзионных повязок (исключая детей).

У **детей** и у **пациентов с поражением кожи** лица курс лечения не должен превышать 5 дней.

Побочное действие:

Жжение, кожный зуд, стероидные угри, стрии, сухость кожи, фолликулит, гипертрихоз, потница.

При длительном применении - атрофия кожи, местный гирсутизм, телеангиэктазия, пурпура, гипопигментация; при нанесении на большие поверхности возможны системные проявления, характерные для ГКС.

Передозировка:

Симптомы: при длительном применении препарата в высоких дозах возможно развитие симптомов гиперкортицизма.

Лечение: проводят симптоматическую терапию. Рекомендуется постепенная отмена препарата. При необходимости проводят коррекцию электролитного баланса.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность применения местных глюкокортикостероидов у беременных женщин не установлена. Назначение этой группы лекарственных средств в период беременности оправдано только в том случае, если потенциальная польза превосходит потенциальный риск для плода.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Хлоргексидин несовместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами. Присутствие мыла может инактивировать хлоргексидин, поэтому перед использованием препарата остатки мыла необходимо тщательно смыть.

Особые указания и меры предосторожности:

Избегать попадания в глаза и на слизистую оболочку. При применении препарата на обширных поверхностях и/или с окклюзионной повязкой необходимо иметь в виду возможность развития системного действия бетаметазона. В случае применения препарата при обыкновенных или розовых угрях возможно обострение заболевания.

Применение в детском возрасте

Противопоказан для лечения сыпи (на фоне опрелости) у детей до 1 года.

У детей курс лечения не должен превышать 5 дней.

Условия хранения:

При температуре от 12° до 15°С. В недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bemilon