Бемилон



Код АТХ:

• D07BC01

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- <u>Бетаметазон</u>
- Хлоргексидин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр $^{\mathrm{MHH}}$ Википедия $^{\mathrm{MHH}}$ MHH P/IC VIDAL Mail.Ru Drugs.com $^{\mathrm{ahrn}}$

Форма выпуска:

Крем для наружного применения	1 r
бетаметазон (в форме валерата)	1 мг
хлоргексидина биглюконат	5 мг

¹⁵ г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Гормоны и их антагонисты
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Бетаметазон - глюкокортикостероид, оказывает местное противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное, противоотечное и антипролиферативное действие. Обладает более сильным вазоконстрикторным действием, чем другие фторпроизводные глюкокортикостероидов, системные эффекты выражены незначительно изза ограниченного всасывания через кожные покровы. При воздействии на кожу происходит предупреждение краевого скопления нейтрофилов, что приводит к уменьшению экссудации, продукции цитокинов, торможению миграции макрофагов, приводящее в конечном итоге к уменьшению процессов инфильтрации и грануляции.

Хлоргексидин - противомикробный препарат, действующий на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, дрожжи, дерматофиты.

³⁰ г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Показания к применению:

Воспалительные и аллергические дерматозы, осложненные вторичным инфицированием и профилактика вторичного инфицирования:

— псориаз;
— парапсориаз;
— липоидный некробиоз;
— контактный дерматит;
— атопический дерматит;
— экземы;
— нейродермит;
— себорейный дерматит;
— эритродермия -кольцевидная эритема;
— узловатая эритема;
— лимфоцитома;
— доброкачественная лимфоплазия;
— красный плоский лишай -пруриго;
— флеботодермия;
— эксфолиативный дерматит;
— герпетиформный дерматит;
— радиационный дерматит;
— лискоилная красная волчанка:

— кожный зуд различной этиологии (в т.ч. зуд заднего прохода и наружных половых органов, старческий зуд).

Относится к болезням:

- Аллергия
- Волчанка
- Герпес
- Дерматит
- Зуд
- Лимфома
- <u>Липома</u>
- <u>Лишай</u>
- Нейродермит
- Псориаз
- Себорея
- Узловатая эритема
- Флебит
- Флеботодермия
- Экзема
- Эритема

Противопоказания:

- кожные проявления сифилиса;
- туберкулез кожи;
- вирусные поражения кожи;

- трофические язвы голени, связанные с варикозным расширением вен;
- новообразования кожи;
- розацеа, вульгарные угри, поствакцинальные кожные реакции;
- у детей до 1 года сыпь (на фоне опрелости);
- гиперчувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: при длительном применении или нанесении на большие поверхности - катаракта, сахарный диабет, глаукома, туберкулез.

Способ применения и дозы:

Наружно. Крем наносят тонким слоем, втирая, на пораженные участки кожи 2-3 раза/сут; в легких случаях — 1 раз/сут. В случаях, трудно поддающихся лечению, возможно применение окклюзионных повязок (исключая детей).

У детей и у пациентов с поражением кожи лица курс лечения не должен превышать 5 дней.

Побочное действие:

Жжение, кожный зуд, стероидные угри, стрии, сухость кожи, фолликулит, гипертрихоз, потница.

При длительном применении - атрофия кожи, местный гирсутизм, телеангиэктазия, пурпура, гипопигментация; при нанесении на большие поверхности возможны системные проявления, характерные для ГКС.

Передозировка:

Симптомы: при длительном применении препарата в высоких дозах возможно развитие симптомов гиперкортицизма.

Лечение: проводят симптоматическую терапию. Рекомендуется постепенная отмена препарата. При необходимости проводят коррекцию электролитного баланса.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность применения местных глюкокортикостероидов у беременных женщин не установлена. Назначение этой группы лекарственных средств в период беременности оправдано только в том случае, если потенциальная польза превосходит потенциальный риск для плода.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Хлоргексидин несовместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами. Присутствие мыла может инактивировать хлоргексидин, поэтому перед использованием препарата остатки мыла необходимо тщательно смыть.

Особые указания и меры предосторожности:

Избегать попадания в глаза и на слизистую оболочку. При применении препарата на обширных поверхностях и/или с окклюзионной повязкой необходимо иметь в виду возможность развития системного действия бетаметазона. В случае применения препарата при обыкновенных или розовых угрях возможно обострение заболевания.

Применение в детском возрасте

Противопоказан для лечения сыпи (на фоне опрелости) у детей до 1 года.

У детей курс лечения не должен превышать 5 дней.

Условия хранения:

При температуре от 12° до 15° С. В недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bemilon