

## Бемилон



### Код АТХ:

- [D07BC01](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бетаметазон](#)
- [Хлоргексидин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Крем для наружного применения</b>	<b>1 г</b>
бетаметазон (в форме валерата)	1 мг
хлоргексидина биглюконат	5 мг

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Бетаметазон - глюкокортикостероид, оказывает местное противовоспалительное, противоаллергическое, противоэдематозное, противоотечное и антипролиферативное действие. Обладает более сильным вазоконстрикторным действием, чем другие фторпроизводные глюкокортикостероидов, системные эффекты выражены незначительно из-за ограниченного всасывания через кожные покровы. При воздействии на кожу происходит предупреждение краевого скопления нейтрофилов, что приводит к уменьшению экссудации, продукции цитокинов, торможению миграции макрофагов, приводящее в конечном итоге к уменьшению процессов инфильтрации и грануляции.

Хлоргексидин - противомикробный препарат, действующий на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, дрожжи, дерматофиты.

## Показания к применению:

Воспалительные и аллергические дерматозы, осложненные вторичным инфицированием и профилактика вторичного инфицирования:

- псориаз;
- парапсориаз;
- липоидный некробиоз;
- контактный дерматит;
- атопический дерматит;
- экземы;
- нейродермит;
- себорейный дерматит;
- эритродермия -кольцевидная эритема;
- узловатая эритема;
- лимфоцитомы;
- доброкачественная лимфоплазия;
- красный плоский лишай -пруриго;
- флеботодермия;
- эксфолиативный дерматит;
- герпетиформный дерматит;
- радиационный дерматит;
- дискоидная красная волчанка;
- кожный зуд различной этиологии (в т.ч. зуд заднего прохода и наружных половых органов, старческий зуд).

## Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Волчанка](#)
- [Герпес](#)
- [Дерматит](#)
- [Зуд](#)
- [Лимфома](#)
- [Липома](#)
- [Лишай](#)
- [Нейродермит](#)
- [Псориаз](#)
- [Себорея](#)
- [Узловатая эритема](#)
- [Флебит](#)
- [Флеботодермия](#)
- [Экзема](#)
- [Эритема](#)

## Противопоказания:

- кожные проявления сифилиса;
  - туберкулез кожи;
  - вирусные поражения кожи;
-

- трофические язвы голени, связанные с варикозным расширением вен;
- новообразования кожи;
- розацеа, вульгарные угри, поствакцинальные кожные реакции;
- у детей до 1 года - сыпь (на фоне опрелости);
- гиперчувствительность к компонентам препарата.

*С осторожностью:* при длительном применении или нанесении на большие поверхности - катаракта, сахарный диабет, глаукома, туберкулез.

## **Способ применения и дозы:**

Наружно. Крем наносят тонким слоем, втирая, на пораженные участки кожи 2-3 раза/сут; в легких случаях — 1 раз/сут. В случаях, трудно поддающихся лечению, возможно применение окклюзионных повязок (исключая детей).

У **детей** и у **пациентов с поражением кожи** лица курс лечения не должен превышать 5 дней.

## **Побочное действие:**

Жжение, кожный зуд, стероидные угри, стрии, сухость кожи, фолликулит, гипертрихоз, потница.

При длительном применении - атрофия кожи, местный гирсутизм, телеангиэктазия, пурпура, гипопигментация; при нанесении на большие поверхности возможны системные проявления, характерные для ГКС.

## **Передозировка:**

*Симптомы:* при длительном применении препарата в высоких дозах возможно развитие симптомов гиперкортицизма.

*Лечение:* проводят симптоматическую терапию. Рекомендуется постепенная отмена препарата. При необходимости проводят коррекцию электролитного баланса.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Безопасность применения местных глюкокортикостероидов у беременных женщин не установлена. Назначение этой группы лекарственных средств в период беременности оправдано только в том случае, если потенциальная польза превосходит потенциальный риск для плода.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Хлоргексидин несовместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами. Присутствие мыла может инактивировать хлоргексидин, поэтому перед использованием препарата остатки мыла необходимо тщательно смыть.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Избегать попадания в глаза и на слизистую оболочку. При применении препарата на обширных поверхностях и/или с окклюзионной повязкой необходимо иметь в виду возможность развития системного действия бетаметазона. В случае применения препарата при обыкновенных или розовых угрях возможно обострение заболевания.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан для лечения сыпи (на фоне опрелости) у детей до 1 года.

У детей курс лечения не должен превышать 5 дней.

**Условия хранения:**

При температуре от 12° до 15°С. В недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

2 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Bemilon>