Бенальгин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки круглые, плоские, белого цвета, с разделительной чертой на одной стороне.

	1 таб.
метамизол натрия	500 мг
кофеин	50 мг
тиамина гидрохлорид	38.75 мг

Вспомогательные вещества: желатин - 4 мг, крахмал пшеничный - 11 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 45.75 мг, кремния диоксид коллоидный - 2.5 мг, тальк - 12 мг, магния стеарат - 6 мг.

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное действие.

Метамизол оказывает обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное действие.

Кофеин оказывает противомигренозное (тонизирует сосуды мозга) и психостимулирующее действие.

Тиамина гидрохлорид (витамин B_1) участвует в обмене веществ и способствует улучшению нервно-рефлекторной регуляции.

Показания к применению:

— умеренно или слабо выраженный болевой синдром (головная, зубная, мигренозная боль, невралгия, миалгия, боли в суставах, корешковый синдром, альгодисменорея, почечная, желчная и кишечная колика).

— повышенная температура тела при простудных и других инфекционно-воспалительных заболеваниях (при установленном диагнозе).

Относится к болезням:

- Альгодисменорея

- Болевой синдром
- Боли в суставах
- Инфекции
- Кишечная колика
- Кишечные колики
- Корешковый синдром
- Миалгия
- Мигрень
- Невралгия
- Неврит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к другим производным пиразолона - бутадиону, трибузону; тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность; бронхоспазм; дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;

— заболевания системы крови (лейкопения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия);

— угнетение костномозгового кроветворения; бессонница;

— неконтролируемая артериальная гипертензия;

— выраженный атеросклероз;

— повышение внутриглазного давления;

— период беременности и грудного вскармливания;

— детский возраст (до 12 лет).

С *осторожностью* - при начальной стадии печеночной и/или почечной недостаточности.

Способ применения и дозы:

Внутрь после еды по 1 таб. 2-3 раза в первой половине дня. Максимальная разовая доза **для взрослых** - 2 таб., суточная - 6 таб. не более 1-2 дней.

Детям в возрасте от 12 до 16 лет - по 0.5-1 таб. 2-3 раза/сут, максимальная суточная доза - 4 таб.

Продолжительность приема - не более 5 дней при назначении в качестве обезболивающего средства и 3 дней - в качестве жаропонижающего средства. Увеличение суточной дозы препарата или продолжительности лечения возможно только под наблюдением врача.

Побочное действие:

Аллергические реакции: (кожная сыпь, зуд, отек Квинке, анафилактический шок); бронхоспазм.

При *длительном приеме* - нарушения системы крови (тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз).

Возможны нарушения сна, сердцебиение, нарушения ритма сердца.

О всех побочных эффектах следует сообщать лечащему врачу.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, боли в эпигастрии, психическое и двигательное возбуждение, тахикардия, нарушения ритма сердца, возможно уменьшение диуреза, эпилептиформные судороги.

Лечение: следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Пострадавшему следует сделать промывание желудка, назначить адсорбенты. При необходимости проводят симптоматическое лечение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан во время беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Одновременное применение метамизола натрия с другими ненаркотическими анальгетиками, НПВС может привести к взаимному усилению токсических эффектов.

Трициклические антидепрессанты, пероральные контрацептивы, аллопуринол нарушают метаболизм метамизола натрия в печени и повышают его токсичность.

Барбитураты, фенилбутазон и другие индукторы микросомальных ферментов печени ослабляют действие метамизола натрия.

Одновременное применение метамизола натрия с циклоспорином снижает уровень последнего в крови.

Седативные средства и транквилизаторы усиливают обезболивающее действие метамизола натрия.

Особые указания и меры предосторожности:

Чрезмерное употребление кофеинсодержащих продуктов (чай, кофе) на фоне лечения может вызвать симптомы передозировки.

С осторожностью и под врачебным контролем применяют у больных с нарушенной функцией печени или почек.

Одновременное применение препарата с алкогольсодержащими напитками не рекомендуется.

Может изменять результаты анализов допинг-контроля спортсменов.

У больных, страдающих атопической бронхиальной астмой, поллинозами, имеется повышенный риск развития реакций гиперчувствительности.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

При приеме Бенальгина необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

С осторожностью и под врачебным контролем применяют у больных с нарушенной функцией почек.

При нарушениях функции печени

С осторожностью и под врачебным контролем применяют у больных с нарушенной функцией печени.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан **детям до 12 лет.**

Дозировки для детей - **детям в возрасте от 12 до 16 лет** - по половине или одной таблетке 2-3 раза в день, максимальная суточная доза - 4 таблетки.

Условия хранения:

В защищенном от света, сухом, недоступном для детей месте, при температуре 15-25°С.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Benalgin