

[Бенатекс \(свечи\)](#)



Код АТХ:

- [G02BB](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бензалкония хлорид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки вагинальные, 20 мг. По 5, 6, 7, 10 или 12 табл. в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги алюминиевой печатной лакированной. 1, 2 или 3 контурной ячейковой упаковки упакованы в пачку из картона.

Суппозитории вагинальные, 18,9 мг. По 5 супп. в контурной ячейковой упаковке; 2 контурные ячейковые упаковки упакованы в картонную пачку.

Гель вагинальный, 1,2%. По 30, 50, 70 и 100 г в алюминиевых или ПЭ ламинатных тубах. Каждую тубу вместе с дозатором-аппликатором помещают в пачку из картона.

Состав:

Таблетки вагинальные	1 табл.
<i>активное вещество:</i>	
бензалкония хлорид (бензилдиметилтетрадецил аммония хлорид) (в пересчете на 100% вещество)	20 мг
<i>вспомогательные вещества:</i> крахмал кукурузный прежелатинизированный; стеариновая кислота; МКЦ (для медицинских целей); адипиновая кислота; макрогол (полиэтиленгликоль) — до получения таблетки массой 550 мг	
Суппозитории вагинальные	1 супп.
<i>активное вещество:</i>	
бензалкония хлорид (бензилдиметилтетрадецил	18,9 мг

Бенатекс (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

аммония хлорид)	
<i>вспомогательное вещество:</i> твердый жир (витепсол) — достаточное количество для получения суппозитория массой 1,75 г	
Гель для интравагинального введения	1 г
<i>активное вещество:</i>	
бензалкония хлорид (бензилдиметилтетрадецил аммония хлорид) (в пересчете на 100% сухое вещество)	0,012 г
<i>вспомогательные вещества:</i> глицерол (глицерин дистиллированный); полоксамер (полоксамер 407; лутрол F127); макрогола глицерилгидроксистеарат (полиоксил 40 гидрированноекасторовое масло, кремофор RH40); вода очищенная — до 1 г	

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — контрацептивное.

Показания к применению:

Местная контрацепция для женщин репродуктивного возраста:

- при наличии противопоказаний к применению пероральных контрацептивов или внутриматочной контрацепции;
- в послеродовом периоде;
- в период лактации;
- в период после прерывания беременности;
- в пременопаузный период;
- при необходимости эпизодического предохранения от беременности;
- при пропуске или опоздании в приеме постоянно используемых пероральных контрацептивов.

Относится к болезням:

- [Контрацепция](#)

Противопоказания:

- кольпит;
- изъязвление и раздражение слизистой оболочки матки и влагалища;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Предварительно освободив суппозиторий от контурной упаковки, его вводят глубоко во влагалище в положении лежа на спине за 5 мин до полового акта.

Разовая доза: 1 суппозиторий рассчитан на 1 половой акт. Продолжительность действия препарата составляет 4 ч.

Бенатекс (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Обязательно вводить новый вагинальный суппозиторий при повторных половых актах. Кратность использования ограничена индивидуальной переносимостью действующего вещества и частотой половых актов.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не оказывает вредного действия на течение беременности.

Препарат можно применять в период грудного вскармливания, поскольку он не выделяется с грудным молоком.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Любое лекарственное средство, введенное интравагинально, может снижать местное сперматоцидное действие (в т.ч. мыло и растворы, его содержащие).

Растворы йода (в т.ч. 0.1% раствор йодоната) инактивируют препарат.

Особые указания и меры предосторожности:

Для повышения эффективности необходимо тщательное соблюдение способа применения препарата.

Возможно применение совместно с влажной диафрагмой или внутриматочной контрацепцией.

После полового акта не рекомендуется интравагинальное использование гигиенических средств (спринцевания мыльной водой, т.к. мыло разрушает активную субстанцию препарата) во избежание потери контрацептивного эффекта; возможен наружный туалет половых органов.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Benateks_svechi