Бенатекс (таблетки)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бензалкония хлорид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки вагинальные*** белого или белого с желтоватым или кремоватым оттенком цвета, двояковыпуклые, продолговатой формы.

	1 таб.
бензалкония хлорид	20 мг

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный прежелатинизированный, стеариновая кислота, целлюлоза микрокристаллическая (для медицинских целей), адипиновая кислота, макрогол (полиэтиленгликоль).

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1, 2, 3) - пачки картонные.
6 шт. - упаковки ячейковые контурные (1, 2, 3) - пачки картонные.
7 шт. - упаковки ячейковые контурные (1, 2, 3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1, 2, 3) - пачки картонные.
12 шт. - упаковки ячейковые контурные (1, 2, 3) - пачки картонные.

◊ ***Таблетки вагинальные*** белого или белого с желтоватым или кремоватым оттенком цвета, двояковыпуклые, продолговатой формы.

	1 таб.
бензалкония хлорид	20 мг

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный прежелатинизированный, стеариновая кислота, целлюлоза микрокристаллическая (для медицинских целей), адипиновая кислота, макрогол (полиэтиленгликоль).

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1, 2, 3) - пачки картонные.
6 шт. - упаковки ячейковые контурные (1, 2, 3) - пачки картонные.
7 шт. - упаковки ячейковые контурные (1, 2, 3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1, 2, 3) - пачки картонные.
12 шт. - упаковки ячейковые контурные (1, 2, 3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Контрацептивный препарат для местного применения. Оказывает сперматоцидное действие, а также антисептическое, противогрибковое, противопротозойное действие, инактивирует вирус Herpes simplex.

Препарат *активен в отношении грамположительных бактерий* (в т.ч. Staphylococcus spp., Streptococcus spp.);

грамотрицательных бактерий (в т.ч. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae, Proteus spp., Klebsiella spp.); *анаэробных бактерий, грибов и плесеней*.

Также *активен в отношении* штаммов бактерий, устойчивых к антибиотикам и другим химиотерапевтическим лекарственным средствам; подавляет плазмокоагулазу и гиалуронидазу стафилококков.

Сперматоцидное действие препарата обусловлено способностью повреждать мембраны сперматозоидов (в начале жгутиков, затем головки), что обусловливает невозможность оплодотворения яйцеклетки поврежденным сперматозоидом. Эффект развивается через 8-10 мин после введения вагинального суппозитория.

Проявляет активность в предупреждении заболеваний, передающихся половым путем (в т.ч. гонорея, хламидиоз, трихомониаз). Не влияет на нормальную микрофлору влагалища (в т.ч. на палочку Дедерлейна) и гормональный цикл.

Фармакокинетика

Препарат практически не всасывается при интравагинальном введении, удаляется простым подмыванием водой и с нормальными физиологическими выделениями.

Показания к применению:

Местная контрацепция для женщин репродуктивного возраста:

— при наличии противопоказаний к применению пероральных контрацептивов или внутриматочной контрацепции;

— в послеродовом периоде;

— в период лактации;

— в период после прерывания беременности;

— в пременопаузный период;

— при необходимости эпизодического предохранения от беременности;

— при пропуске или опоздании в приеме постоянно используемых пероральных контрацептивов.

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.

Относится к болезням:

- Контрацепция

Противопоказания:

— кольпит;

— изъязвление и раздражение слизистой оболочки влагалища и шейки матки;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Предварительно освободив от контурной упаковки, таблетку вводят глубоко во влагалище в положении лежа на спине за 10 мин до полового акта.

Разовая доза: 1 таблетка рассчитана на 1 половой акт. Продолжительность действия препарата составляет 3 ч.

Обязательно вводить новую вагинальную таблетку при повторных половых актах. Кратность использования ограничена индивидуальной переносимостью действующего вещества и частотой половых актов.

Побочное действие:

Аллергические реакции: зуд, жжение, контактный дерматит.

Передозировка:

В связи с низкой системной абсорбцией передозировка маловероятна.

В настоящее время симптомы передозировки не описаны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При случайном использовании препарата при беременности препарат не оказывает вредного воздействия на плод и течение беременности.

Препарат можно применять в период грудного вскармливания, поскольку он не выделяется с грудным молоком.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Любое лекарственное средство, введенное интравагинально, может снижать местное сперматоцидное действие (в т.ч. мыло и растворы, его содержащие).

Растворы йода (в т.ч. 0.1% раствор йодоната) инактивируют препарат.

Особые указания и меры предосторожности:

Для повышения эффективности необходимо тщательное соблюдение способа применения препарата.

Возможно применение совместно с влагалищной диафрагмой или внутриматочной контрацепцией.

После полового акта не рекомендуется интравагинальное использование гигиенических средств (спринцевания мыльной водой, т.к. мыло разрушает активную субстанцию препарата) во избежание потери контрацептивного эффекта; возможен наружный туалет половых органов.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Benateks_tabletki