

Бензидамин



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Раствор для местного применения** бесцветный, прозрачный, с характерным запахом.

	1 мл
бензидамина гидрохлорид	1.5 мг

Вспомогательные вещества: этанол (этиловый спирт 95%) - 80 мг, глицерин - 50 мг, метилпарагидроксибензоат - 1 мг, ароматизатор пищевой натуральный МЯТА - 0.3 мг, натрия сахаринат - 0.24 мг, полисорбат 20 - 0.05 мг, натрия гидрокарбонат - в количестве необходимом для поддержания pH, вода очищенная - до 1 мл.

50 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерным стаканчиком - пачки картонные.

100 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерным стаканчиком - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

НПВС. Механизм действия связан с ингибированием фермента ЦОГ и нарушением синтеза простагландинов.

Показания к применению:

Для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии: воспалительные заболевания полости рта и горла, в качестве дополнительного средства при консервативной терапии после экстракции зуба, после оперативных вмешательств и травм (тонзиллэктомия, переломы челюсти), калькулезное воспаление слюнных желез.

Для местного применения в акушерстве и гинекологии: в послеродовом периоде для профилактики послеродовых инфекционных осложнений, специфические вульвовагиниты (в составе комплексной терапии), неспецифические вульвовагиниты и цервиковагиниты любой этиологии (включая вторично развившиеся на фоне химиотерапии и радиотерапии), бактериальный вагиноз, профилактика постоперационных инфекционных осложнений в оперативной гинекологии.

Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Воспаление](#)

Бензидамин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- [Вульвит](#)
- [Инфекции](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Травмы](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к бензидамину.

Способ применения и дозы:

Местно применяется 1-2 раза/сут.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, чувство жжения.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью применять при беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Тромбоз глубоких вен
- Тромбофлебит
- Трофическая язва голени, стопы

Источник: <http://drugs.thead.ru/Benzidamin>