

Бензилбензоат (мазь)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

[Бензилбензоат \(мазь\)](#)



Код АТХ:

- [P03AX01](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бензилбензоат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения 10%	1 г
бензил бензоат медицинский	100 мг

25 г - банки.

25 г - банки (1) - пачки картонные.

25 г - тубы алюминиевые.

25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Мазь для наружного применения 20%	1 г
бензил бензоат медицинский	200 мг

25 г - банки.

25 г - банки (1) - пачки картонные.

25 г - тубы алюминиевые.

25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противопаразитарный препарат для наружного применения. Активен в отношении чесоточных клещей, а также вшей.

Показания к применению:

— лечение чесотки.

Относится к болезням:

- [Чесотка](#)

Противопоказания:

- не рекомендуется использование детям до 3 лет;
- беременность;
- период кормления грудью.

Способ применения и дозы:

Курс лечения продолжается 4 дня.

Взрослым назначают 20% мазь, а **детям** - 10%.

В первый день обработку проводят вечером перед сном после тщательного мытья под душем теплой водой с мылом. Мазь втирают в кожу рук, затем туловища и ног, включая подошвы и пальцы. После обработки кожи следует использовать только чистое белье и одежду.

На 2-й и 3-й дни делают перерыв в лечении, при этом остатки мази не смывают с кожи. На 4-й день вечером больной моется с мылом и проводит втирание мази, как в первый день, используя оставшуюся мазь и еще раз меняют все белье.

Руки после обработки не следует мыть в течение 3 ч; в последующем руки обрабатывают мазью после каждого мытья.

В случае смывания эмульсии с других участков кожи их нужно также повторно обработать. Мазь полностью смывают с кожи на пятый день лечения.

Лечение *осложненной чесотки (дерматит, экзема, пиодермия, постскабиозная лимфооплазия)* должно проводиться одновременно с лечением чесотки и продолжаться после его завершения.

Побочное действие:

Местные реакции: возможно (особенно у детей) ощущение жжения, раздражения кожи.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется использование беременными и в период кормления грудью.

Особые указания и меры предосторожности:

Лечение больных, выявленных в одном очаге, а также контактных лиц, должно проводиться одновременно во избежание повторного заражения.

Сохранение зуда после лечения не является показанием для назначения дополнительного курса специфической терапии. Зуд является реакцией организма на убитого клеща и продукты его жизнедеятельности и исчезает при назначении антигистаминных препаратов и кортикостероидных мазей.

После лечения необходим врачебный контроль в течение 2 недель, а при наличии осложнений и более длительное время.

Следует избегать попадания препарата на слизистые оболочки, т.к. возникает сильное жжение. Маленьким детям после обработки надевают распашонку с зашитыми рукавами.

Все белье и прочее, что соприкасалось с зараженной кожей, должно быть подвергнуто тщательной обработке. Постельные принадлежности, полотенца, постельное белье кипятят в растворе стирального порошка в течение 5-10 мин.

Верхнюю одежду проглаживают с обеих сторон горячим утюгом.

Вещи, не подлежащие термической обработке, вывешиваются на открытом воздухе на 3 дня.

Бензилбензоат (мазь)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Обувь, игрушки и прочие предметы исключают из пользования на 5 дней и помещают в целлофановый пакет.

Матрацы, подушки, одеяла также исключаются из пользования на 5 дней или подвергаются камерной дезинфекции.

Мягкую мебель можно обработать препаратами для дезинсекции.

В квартире необходимо провести уборку, мытье полов с моющими средствами или добавлением дезинфицирующих средств.

Необходимо избегать попадания препарата в глаза, нос, рот.

При попадании препарата в рот: прополоскать обильно водой или 2% раствором теплой питьевой соды и обеспечить покой.

При попадании препарата в желудок: желудок промывают 1-2% раствором питьевой соды, водной смесью жженой магнезии и активированного угля или водной смесью толченого мела (2 столовые ложки на 1 литр воды), после чего дают выпить смесь 1-2 столовых ложек активированного угля и жженой магнезии в стакане воды, затем принимают солевое слабительное (нельзя давать касторовое масло!).

При попадании препарата в глаза: тщательно промыть водой или питьевой содой; при раздражении слизистой оболочки глаз закапывают за веко 30% раствор сульфаниламида (альбуцида), при болях - 2% раствор прокаина (новокаина).

Если появляются признаки раздражения кожи, использование препарата прекращается.

Применение в детском возрасте

Не рекомендуется использование детям до 3 лет.

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше + 20°C. Список Б. Следует хранить в местах, недоступных для детей.

По истечении указанного срока годности мазь не должна применяться.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Benzilbenzoat_maz