Бепантен (крем)



Код АТХ:

- D03AX03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Декспантенол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Крем для наружного применения 5%*** от белого до белого с желтоватым оттенком цвета, мягкий, эластичный, гомогенный, матовый, со слабым специфическим запахом.

	1 г
декспантенол	50 мг

Вспомогательные вещества: D,L-пантолактон - 5 мг, феноксиэтанол - 5 мг, калия цетилфосфат (амфизол K) - 12.7 мг, цетиловый спирт - 24 мг, стеариловый спирт - 16 мг, ланолин - 13 мг, изопропилмиристат - 35 мг, пропиленгликоль - 15 мг, вода очищенная - до 1000 мг.

3.5 г - тубы алюминиевые с носиком полиэтиленовым (1) - пачки картонные.
30 г - тубы алюминиевые с носиком полиэтиленовым (1) - пачки картонные.
100 г - тубы алюминиевые с носиком полиэтиленовым (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Стимулятор регенерации тканей. Декспантенол в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту, которая является составной частью коэнзима А и играет важную роль как в формировании, так и в заживлении поврежденных кожных покровов. Стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный обмен.

Фармакокинетика

Декспантенол быстро абсорбируется кожей (быстро впитывается) и превращается в пантотеновую кислоту.

Связывается с белками плазмы крови (главным образом с альбумином и β-глобулином).

Пантотеновая кислота не метаболизируется в организме и выводится в неизмененном виде.

Показания к применению:

— нарушение целостности кожных покровов: заживление ожогов (в т.ч. солнечных), мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы, трещины и др.);

— профилактика и лечение сухости кожи, в т.ч. и как следствие дерматитов различного генеза;

— ежедневный уход за участками кожных покровов, подверженных наибольшему воздействию внешних факторов (лицо, руки);

— уход за молочными железами в период лактации (трещины и покраснения сосков молочной железы);

— уход за грудными детьми и младенцами (опрелость, пеленочный дерматит).

Относится к болезням:

- Дерматит
- Порезы
- Ссадины

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Применяют наружно. Крем наносят тонким слоем на пораженную поверхность и слегка втирают. Применяют 1-2 раза/сут.

Уход за молочными железами у кормящих матерей: крем наносят на соски после каждого кормления.

Уход за грудным ребенком: крем наносят при каждой смене подгузника (пеленки).

Побочное действие:

В крайне редких случаях возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Крем можно применять при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данных о лекарственном взаимодействии препарата нет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bepanten_krem