

Бепантен (мазь)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Бепантен (мазь)



Код АТХ:

- [D03AX03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Декспантенол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения 5%** от белого до бледно-желтого цвета, мягкая, эластичная, гомогенная, непрозрачная, со слабым запахом ланолина.

	1 г
декспантенол	50 мг

Вспомогательные вещества: протегин Х - 50 мг, цетиловый спирт - 18 мг, стеариловый спирт - 12 мг, воск пчелиный белый - 40 мг, ланолин - 250 мг, парафин мягкий белый - 130 мг, масло миндальное - 50 мг, парафин жидкий - 150 мг, вода очищенная - до 1000 мг.

3.5 г - тубы алюминиевые лакированные (1) - пачки картонные.

30 г - тубы алюминиевые лакированные (1) - пачки картонные.

100 г - тубы алюминиевые лакированные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Стимулятор регенерации тканей. Декспантенол в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту, которая является составной частью коэнзима А и играет важную роль как в формировании, так и в заживлении поврежденных кожных покровов. Стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный обмен.

Фармакокинетика

Декспантенол быстро абсорбируется кожей (быстро впитывается) и превращается в пантотеновую кислоту.

Связывается с белками плазмы крови (главным образом с альбумином и β -глобулином).

Пантотеновая кислота не метаболизируется в организме и выводится в неизменном виде.

Показания к применению:

- профилактика и лечение сухости кожи при нарушении целостности ее покровов;
- уход за молочными железами в период кормления (лечение сухости сосков и болезненных трещин);
- лечение и уход за кожей ребенка (опрелость, пеленочный дерматит);
- активизация процесса заживления кожи при мелких повреждениях, легких ожогах, ссадинах, кожных раздражениях, хронических язвах, пролежнях, трещинах и при пересадке кожи.

Относится к болезням:

- [Пролежни](#)
- [Ссадины](#)
- [Язва](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Применяют наружно. Мазь наносят на поврежденный или воспаленный участок кожи 1-2 раза/сут и слегка втирают.

Уход за молочными железами у кормящих матерей: мазь наносят на соски после каждого кормления.

Уход за грудным ребенком: мазь наносят при каждой смене подгузника (пеленки).

Побочное действие:

Аллергические реакции: крапивница, зуд.

Передозировка:

Декспантенол, даже в очень высоких дозах, хорошо переносится и не вызывает каких-либо нежелательных реакций. До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы. Случаи гипервитаминоза неизвестны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Бепантен мазь можно применять при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Случаи взаимодействия с другими лекарственными препаратами неизвестны.

Бепантен (мазь)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания в глаза.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bepanten_maz