

## Бепантен плюс



### Код АТХ:

- [D08AC52](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Декспантенол](#)
- [Хлоргексидин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◊ **Крем для наружного применения** от белого до белого с желтоватым оттенком цвета, однородный, мягкий, матовый, со слабым характерным запахом.

|                           |            |
|---------------------------|------------|
|                           | <b>1 г</b> |
| декспантенол              | 50 мг      |
| хлоргексидина гидрохлорид | 5 мг       |

**Вспомогательные вещества:** пантолактон - 5 мг, цетиловый спирт - 36 мг, стеариловый спирт - 24 мг, ланолин - 30 мг, парафин белый мягкий - 100 мг, парафин жидкий - 100 мг, макрогола стеарат - 30 мг, вода очищенная - до 1 г.

3.5 г - тубы алюминиевые с носиком полиэтиленовым (1) - пачки картонные.  
30 г - тубы алюминиевые с носиком полиэтиленовым (1) - пачки картонные.  
100 г - тубы алюминиевые с носиком полиэтиленовым (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)
- [Регенеранты и репаранты](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Препарат с противомикробным, противовоспалительным и улучшающим регенерацию тканей действием для наружного применения.

*Хлоргексидин* - антисептик, который активен против бактерий, имеющих обычно на коже или попавших на кожу в результате загрязнения раны.

*Декспантенол* в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту, которая играет важную роль как в формировании, так и в заживлении поврежденных кожных покровов.

Препарат уменьшает боль благодаря охлаждающему действию. При нанесении на поверхность раны защищает от инфекции, способствуя заживлению.

Легко наносится и смывается. Крем нежирный и не липнет.

### Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Бепантен плюс не предоставлены.

## Показания к применению:

- небольшие раны с угрозой инфицирования (ссадины, царапины, небольшие порезы и расчесы, трещины, легкие ожоги);
- инфицированные поверхностные поражения кожи;
- трещины сосков в период грудного вскармливания;
- хронические раны (например, трофические язвы голени, пролежни);
- операционные раны.

## Относится к болезням:

- [Ожоги](#)
- [Поражения кожи](#)
- [Порезы](#)
- [Пролежни](#)
- [Раны](#)
- [Ссадины](#)
- [Царапины](#)

## Противопоказания:

- для обработки или лечения ушной раковины;
- в случае тяжелых, глубоких и сильно загрязненных ран (такие повреждения требуют врачебного вмешательства);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Крем наносят тонким слоем 1 или несколько раз/сут на предварительно очищенную раневую поверхность или на воспаленные участки кожи. Лечение ран может проводиться как открытым способом, так и с использованием повязок.

## Побочное действие:

*Аллергические реакции:* возможны крапивница, зуд.

## **Передозировка:**

Данные о передозировке препарата Бепантен плюс не предоставлены.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат можно использовать при беременности и в период грудного вскармливания, однако следует избегать его применения на больших поверхностях кожи.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

В качестве меры предосторожности относительно возможного взаимодействия (антагонизм или инактивация), не следует применять Бепантен плюс одновременно с другими антисептиками.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Следует избегать попадания крема в глаза. Нельзя принимать внутрь.

Большие по площади, сильно загрязненные и глубокие раны, а также укушенные и колотые раны требуют врачебного вмешательства (из-за риска развития столбняка).

Если размеры раны в течение некоторого времени остаются неизменно большими или рана не заживает в течение 10-14 дней, то необходима консультация врача. Это необходимо и в случае, если края раны сильно гиперемированы, рана неожиданно отекает, появляются сильные боли или повреждение сопровождается лихорадкой (из-за опасности развития сепсиса).

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Bepanten\\_plyus](http://drugs.thead.ru/Bepanten_plyus)