Бепантен плюс



Код АТХ:

- D08AC52

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Декспантенол
- Хлоргексидин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Крем для наружного применения*** от белого до белого с желтоватым оттенком цвета, однородный, мягкий, матовый, со слабым характерным запахом.

	1 г
декспантенол	50 мг
хлоргексидина гидрохлорид	5 мг

Вспомогательные вещества: пантолактон - 5 мг, цетиловый спирт - 36 мг, стеариловый спирт - 24 мг, ланолин - 30 мг, парафин белый мягкий - 100 мг, парафин жидкий - 100 мг, макрогола стеарат - 30 мг, вода очищенная - до 1 г.

3.5 г - тубы алюминиевые с носиком полиэтиленовым (1) - пачки картонные.
30 г - тубы алюминиевые с носиком полиэтиленовым (1) - пачки картонные.
100 г - тубы алюминиевые с носиком полиэтиленовым (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства
- Регенеранты и репаранты

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат с противомикробным, противовоспалительным и улучшающим регенерацию тканей действием для наружного применения.

Хлоргексидин - антисептик, который активен против бактерий, имеющихся обычно на коже или попавших на кожу в результате загрязнения раны.

Декспантенол в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту, которая играет важную роль как в формировании, так и в заживлении поврежденных кожных покровов.

Препарат уменьшает боль благодаря охлаждающему действию. При нанесении на поверхность раны защищает от инфекции, способствуя заживлению.

Легко наносится и смывается. Крем нежирный и не липнет.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Бепантен плюс не предоставлены.

Показания к применению:

— небольшие раны с угрозой инфицирования (ссадины, царапины, небольшие порезы и расчесы, трещины, легкие ожоги);

— инфицированные поверхностные поражения кожи;

— трещины сосков в период грудного вскармливания;

— хронические раны (например, трофические язвы голени, пролежни);

— операционные раны.

Относится к болезням:

- Ожоги
- Поражения кожи
- Порезы
- Пролежни
- Раны
- Ссадины
- Царапины

Противопоказания:

— для обработки или лечения ушной раковины;

— в случае тяжелых, глубоких и сильно загрязненных ран (такие повреждения требуют врачебного вмешательства);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Крем наносят тонким слоем 1 или несколько раз/сут на предварительно очищенную раневую поверхность или на воспаленные участки кожи. Лечение ран может проводиться как открытым способом, так и с использованием повязок.

Побочное действие:

Аллергические реакции: возможны крапивница, зуд.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Бепантен плюс не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат можно использовать при беременности и в период грудного вскармливания, однако следует избегать его применения на больших поверхностях кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В качестве меры предосторожности относительно возможного взаимодействия (антагонизм или инактивация), не следует применять Бепантен плюс одновременно с другими антисептиками.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания крема в глаза. Нельзя принимать внутрь.

Большие по площади, сильно загрязненные и глубокие раны, а также укушенные и колотые раны требуют врачебного вмешательства (из-за риска развития столбняка).

Если размеры раны в течение некоторого времени остаются неизменно большими или рана не заживает в течение 10-14 дней, то необходима консультация врача. Это необходимо и в случае, если края раны сильно гиперемированы, рана неожиданно отекает, появляются сильные боли или повреждение сопровождается лихорадкой (из-за опасности развития сепсиса).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bepanten_plyus