

Берберис-Гомаккорд



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капли для приема внутрь гомеопатические** бесцветные или очень светлого желтовато-зеленого цвета, прозрачные, с запахом этанола.

	100 г
Berberis vulgaris (Berberis) (берберис вульгарис (берберис)) D2	400 мг
Berberis vulgaris (Berberis) (берберис вульгарис (берберис)) D10	400 мг
Berberis vulgaris (Berberis) (берберис вульгарис (берберис)) D30	400 мг
Berberis vulgaris (Berberis) (берберис вульгарис (берберис)) D200	400 мг
Citrullus colocynthis (Colocynthis) (цитруллюс колоцинтис (колоцинтис)) D2	300 мг
Citrullus colocynthis (Colocynthis) (цитруллюс колоцинтис (колоцинтис)) D10	300 мг
Citrullus colocynthis (Colocynthis) (цитруллюс колоцинтис (колоцинтис)) D30	300 мг
Citrullus colocynthis (Colocynthis) (цитруллюс колоцинтис (колоцинтис)) D200	300 мг
Veratrum album (вератрум альбум) D3	300 мг
Veratrum album (вератрум альбум) D10	300 мг
Veratrum album (вератрум альбум) D30	300 мг
Veratrum album (вератрум альбум) D200	300 мг

Вспомогательные вещества: этанол (около 35 об.%).

30 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатическое средство.

Показания к применению:

— в комплексной терапии при спастических состояниях моче- и желчевыводящих путей на фоне воспалительных заболеваний (цистит, пиелостит, холецистит, холангит, желчно- и мочекаменная болезнь).

Относится к болезням:

- [Мочекаменная болезнь](#)
- [Пиелит](#)
- [Холангит](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)

Противопоказания:

— возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых симптомах принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-х часов. Продолжительность курса лечения определяется врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.

Препарат содержит этиловый спирт около 35% (объемных).

Применение в детском возрасте

В связи с недостаточностью клинических данных не назначают детям в возрасте до 18 лет.

Условия хранения:

Берберис-Гомаккорд

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте! Срок годности - 5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Berberis-Gomakkord>