

## Беталгон



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения** белого цвета или белого с оттенком от светло-желтого до светло-коричневого цвета, со специфическим запахом.

	<b>1 г</b>
никобоксил (β-бутоксипропиловый эфир никотиновой кислоты)	25 мг
нонивамид (ванилиламид пеларгоновой кислоты)	4 мг

*Вспомогательные вещества:* цитраль, вода очищенная, воск пчелиный, вазелин.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат для наружного применения, содержит 2 высокоактивных сосудорасширяющих компонента. Оказывает местнораздражающее, спазмолитическое и отвлекающее действие, а также обладает противовоспалительным, анальгезирующим и согревающим эффектом, стимулирует местное кровообращение. Улучшение кровообращения в коже сопровождается усилением кровотока в подлежащих тканях.

Эффект наступает через несколько минут после применения препарата и достигает максимума в течение 20-30 мин.

#### **Фармакокинетика**

Данные по фармакокинетике препарата Беталгон не предоставлены.

### Показания к применению:

- миалгии и артралгии;
- ушибы;
- повреждения мышц и связок;
- невралгии;

- остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом;
- люмбаго;
- ишиас;
- спортивные травмы;
- нарушения периферического кровообращения.

**Относится к болезням:**

- [Артралгия](#)
- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Ишиас](#)
- [Корешковый синдром](#)
- [Люмбаго](#)
- [Миалгия](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Остеохондроз](#)
- [Травмы](#)
- [Ушиб](#)
- [Ушибы](#)

**Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Беталгон не следует наносить на область открытых ран, а также на раздраженную или поврежденную кожу.

**Способ применения и дозы:**

Применение препарата Беталгон следует начинать с использования очень небольших количеств мази. Столбик мази длиной не более 0.5 см (размером с горошину) при помощи аппликатора наносится на соответствующий участок кожи (площадь приблизительно соответствует площади ладони). Для усиления терапевтического эффекта препарата участок нанесения мази можно накрыть шерстяной тканью.

Пациент должен быть предупрежден о недопустимости применения препарата более 10 дней без консультации врача.

**Побочное действие:**

*Возможно:* аллергические реакции.

**Передозировка:**

При нанесении слишком большого количества Беталгона действие препарата можно ослабить, протерев кожу салфеткой, смоченной растительным маслом или питательным кремом.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

С осторожностью применяют препарат при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие препарата Беталгон не описано.

**Особые указания и меры предосторожности:**

Следует избегать попадания Беталгона в глаза и на слизистые оболочки (носа и полости рта), т.к. при попадании вызывает неприятное ощущение жжения (в остальном безвреден).

Пациентам с чувствительной кожей не следует принимать горячий душ или ванну до и после применения Беталгона. После применения Беталгона следует тщательно вымыть руки с мылом.

*Использование в педиатрии*

Препарат не предназначен к применению у детей. Вопрос о назначении препарата детям решается в индивидуальном порядке.

***Применение в детском возрасте***

Препарат не предназначен к применению у детей. Вопрос о назначении препарата детям решается в индивидуальном порядке.

**Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 20°C.

**Срок годности:**

2 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Betalgon>