

## Бетанорм



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Синтетический аналог гистамина. Действует подобно гистамину, главным образом, на гистаминовые H<sub>1</sub>-рецепторы. Вызывает расширение прекапилляров, в частности, облегчает микроциркуляцию в лабиринте. Кроме того, бетагистин регулирует давление эндолимфы в лабиринте и улитке, приводя к клиническому улучшению при головокружении различной этиологии. Снижает частоту и интенсивность головокружения, уменьшает шум в ушах, способствует улучшению слуха в случаях его снижения. Повышает тонус гладкой мускулатуры бронхов, ЖКТ. Может вызвать усиление секреции желудочного сока.

#### **Фармакокинетика**

После приема внутрь бетагистина дигидрохлорид быстро и практически полностью абсорбируется из ЖКТ. Связывание с белками плазмы низкое.

Практически полностью выводится из организма с мочой в течение 24 ч. T<sub>1/2</sub> - 3-4 ч.

### Показания к применению:

Болезнь Меньера; синдромы, характеризующиеся головокружением, шумом в ушах и/или прогрессирующей потерей слуха, в т.ч. водянка лабиринта внутреннего уха, вестибулярные и лабиринтные нарушения (включая головокружение, шум и боль в ушах, головная боль, тошнота, рвота, снижение слуха), вестибулярный неврит, лабиринтит, доброкачественное позиционное головокружение (в т.ч. после нейрохирургических операций); вертебробазиллярная недостаточность, посттравматическая энцефалопатия, атеросклероз сосудов головного мозга (в составе комплексной терапии).

### Относится к болезням:

- [Атеросклероз](#)
- [Головокружение](#)
- [Неврит](#)
- [Рвота](#)
- [Тошнота](#)
- [Энцефалит](#)

### Противопоказания:

## **Бетанорм**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Феохромоцитома, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, бронхиальная астма, I триместр беременности повышенная чувствительность к бетагистину.

### **Способ применения и дозы:**

Разовая доза - 8-16 мг, кратность приема - 3 раза/сут. Лечение проводят длительно.

### **Побочное действие:**

*Со стороны пищеварительной системы:* возможны незначительно выраженные тошнота, чувство тяжести в эпигастрии.

*Аллергические реакции:* в отдельных случаях - кожная сыпь, зуд, крапивница.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Не рекомендуется применение в I триместре беременности и в период лактации. С осторожностью следует применять во II и III триместрах беременности.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Антигистаминные препараты при одновременном приеме снижают эффект бетагистина.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью следует применять у пациентов с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки в анамнезе, во II и III триместрах беременности, а также у детей.

Необходимо учитывать, что желаемый клинический эффект достигается после нескольких месяцев лечения.

При диспептических симптомах бетагистин рекомендуется принимать во время или после еды.

#### ***Применение в детском возрасте***

С осторожностью следует применять у детей.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Betanorm>