Бевиплекс



Код АТХ:

- A11BA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамины

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций	**1 амп.**
кальция пантотенат	10 мг
никотинамид	100 мг
пиридоксина гидрохлорид	8 мг
рибофлавина натрия фосфат	4 мкг
тиамина гидрохлорид	40 мг
цианокобаламин	4 мг

Растворитель: вода д/инъекций - 2 мл.

Ампулы (5) в комплекте с растворителем (амп. 5 шт.) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Бевиплекс представляет собой комплекс витаминов группы В, являющихся составной частью энзимов, регулирующих метаболизм углеводородов, жиров и белков в организме.

Фармакокинетика

Каждый витамин, входящий в комплекс претерпевает свойственные ему естественные превращения.

Показания к применению:

Профилактика и лечение недостаточности витаминов группы В:

— в комплексном лечении неврологических заболеваний: невритов, радикулитов, невралгий, периферических параличей, а также при диабетических полинейропатиях; терапия нарушений, вызванных хроническим алкоголизмом;

— первичный дефицит витаминов группы В, связанный с несбалансированном питанием;

— вторичный дефицит витаминов группы В: при нарушениях всасывания в кишечнике (спру, диарея и продолжительная терапия антибиотиками);

— гиповитаминоз (бери-бери, пеллагра, глоссит, хейлит, стоматит, арибофлавиноз);

— во время или после применения лекарств, которые затрудняют усвоение или способствуют выведению из организма витаминов группы В (цитостатики, изониазид, циклосерин, гидралазин, пероральные контрацептивы);

— беременность и лактация (недостаток поступления с пищей витаминов группы В, как и в случае неукротимой рвоты беременных);

— в дерматологической практике при дерматозах, фотодерматозах, зуде различной этиологии, нейродермитах, экземе, псориазе;

— в глазной практике при кератитах, конъюнктивитах, помутнении роговицы;

— как общеукрепляющее средство при нарушениях питания, заболеваниях печени, астениях, неврастениях;

— при спазмах периферических сосудов, в комплексном лечении эндартериитов;

— при состояниях после рентгеновского облучения.

Относится к болезням:

- Астения
- Дерматит
- Зуд
- Кератит
- Конъюнктивит
- Невралгия
- Неврит
- Неврозы
- Нейродермит
- Паралич
- Полинейропатия
- Псориаз
- Радикулит
- Спазмы
- Стоматит
- Фотодерматоз
- Экзема

Противопоказания:

— терапия леводопой;

— повышенная чувствительность к витаминам группы В.

Способ применения и дозы:

Взрослым - 1-2 амп. в/м или в/в 1-2 раза/сут. Курс применения препарата - по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, сонливость, бледность кожных покровов.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Разрешено по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Пиридоксин (витамин B_6) уменьшает действие леводопы в терапии болезни Паркинсона.

Пиридоксин (витамин B_6) может снижать эффекты стероидных гормонов.

Изониазид увеличивает выделение данного витамина с мочой. Циклосерин, гидралазин и пеницилламин являются антагонистами витамина B_6.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре до 15°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bevipleks