

Бевиплекс



Код АТХ:

- [A11BA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

| | |
|--|---------------|
| Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций | 1 амп. |
| кальция пантотенат | 10 мг |
| никотинамид | 100 мг |
| пиридоксина гидрохлорид | 8 мг |
| рибофлавина натрия фосфат | 4 мкг |
| тиамина гидрохлорид | 40 мг |
| цианокобаламин | 4 мг |

Растворитель: вода д/инъекций - 2 мл.

Ампулы (5) в комплекте с растворителем (амп. 5 шт.) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Бевиплекс представляет собой комплекс витаминов группы В, являющихся составной частью ферментов, регулирующих метаболизм углеводов, жиров и белков в организме.

Фармакокинетика

Каждый витамин, входящий в комплекс претерпевает свойственные ему естественные превращения.

Показания к применению:

Профилактика и лечение недостаточности витаминов группы В:

- в комплексном лечении неврологических заболеваний: невритов, радикулитов, невралгий, периферических параличей, а также при диабетических полинейропатиях; терапия нарушений, вызванных хроническим алкоголизмом;
- первичный дефицит витаминов группы В, связанный с несбалансированным питанием;
- вторичный дефицит витаминов группы В: при нарушениях всасывания в кишечнике (спру, диарея и продолжительная терапия антибиотиками);
- гиповитаминоз (бери-бери, пеллагра, глоссит, хейлит, стоматит, арибофлавиноз);
- во время или после применения лекарств, которые затрудняют усвоение или способствуют выведению из организма витаминов группы В (цитостатики, изониазид, циклосерин, гидралазин, пероральные контрацептивы);
- беременность и лактация (недостаток поступления с пищей витаминов группы В, как и в случае неукротимой рвоты беременных);
- в дерматологической практике при дерматозах, фотодерматозах, зуде различной этиологии, нейродермитах, экземе, псориазе;
- в глазной практике при кератитах, конъюнктивитах, помутнении роговицы;
- как общеукрепляющее средство при нарушениях питания, заболеваниях печени, астениях, неврастениях;
- при спазмах периферических сосудов, в комплексном лечении эндартериитов;
- при состояниях после рентгеновского облучения.

Относится к болезням:

- [Астения](#)
- [Дерматит](#)
- [Зуд](#)
- [Кератит](#)
- [Конъюнктивит](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Нейродермит](#)
- [Паралич](#)
- [Полинейропатия](#)
- [Псориаз](#)
- [Радикулит](#)
- [Спазмы](#)
- [Стоматит](#)
- [Фотодерматоз](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

- терапия леводопой;
- повышенная чувствительность к витаминам группы В.

Способ применения и дозы:

Взрослым - 1-2 амп. в/м или в/в 1-2 раза/сут. Курс применения препарата - по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, сонливость, бледность кожных покровов.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Разрешено по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Пиридоксин (витамин В₆) уменьшает действие леводопы в терапии болезни Паркинсона.

Пиридоксин (витамин В₆) может снижать эффекты стероидных гормонов.

Изониазид увеличивает выделение данного витамина с мочой. Циклосерин, гидралазин и пеницилламин являются антагонистами витамина В₆.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре до 15°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Bevipleks>