

## Безорнил



### Код АТХ:

- [C05AX](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Мазь для ректального и наружного применения</b>	<b>1 г</b>
искусственный мускус (мускон)	9 мг
жемчуг	53.5 мг
искусственный безоар	11 мг
янтарь	3.5 мг
борнеол	38 мг
цинка карбонат (каламин)	108 мг

2 г - тубы алюминиевые с наконечником (1) - пачки картонные.

10 г - тубы пластиковые (1) в комплекте с 4 наконечниками - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Регенеранты и репаратанты](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комплексный препарат с местным вяжущим, противоотечным, антисептическим, обезболивающим, кровоостанавливающим действием.

Фармакологическое действие обусловлено комбинированным действием биологически активных веществ, входящих в его состав (природных и идентичных природным синтетических компонентов).

Эффективен в отношении наблюдающихся при геморрое болевых ощущений, кровотечений, а также в отношении трещин и зуда в области ануса.

### Показания к применению:

— геморрой;

## Безорнил

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

— трещины заднего прохода;

— экземы заднего прохода.

### Относится к болезням:

- [Геморрой](#)
- [Экзема](#)

### Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

Ректально. При внутренних геморроидальных узлах и трещинах мазь вводить с помощью пластмассового наконечника в задний проход 2 раза/сут и после каждой дефекации.

При наружных геморроидальных узлах, трещинах и экземе наносить на область поражения 2 раза в день и после каждой дефекации. Дополнительно рекомендуется нанести мазь на стерильную салфетку и поместить ее на область поражения.

### Побочное действие:

Аллергические реакции.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода и ребенка.

### Особые указания и меры предосторожности:

В случае, если имеющиеся симптомы заболевания не уменьшаются в процессе лечения или отмечается появление новых необычных ощущений следует обратиться к врачу.

### Условия хранения:

В сухом, прохладном (до 15°C), защищенном от света, недоступном для детей месте.

### Срок годности:

3 года.

### Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Bezornil>