

## Биартрин



### Код АТХ:

- [M09AH](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гликозаминогликан-пептидный комплекс](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Раствор для в/м введения</b>	<b>1 мл</b>
Гликозаминогликан-пептидный комплекс	2.5 мг

*Вспомогательные вещества:* метакрезол - 2.5 мг, вода д/и до 1 мл.

1 мл - ампулы (5) - пачки картонные.

1 мл - ампулы (10) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат животного происхождения, содержит гликозаминогликан-пептидный комплекс. Действие препарата обусловлено совокупным действием его активных компонентов. Нормализует обмен веществ в хрящевой гиалиновой ткани: усиливает биосинтез сульфатированных мукополисахаридов и коллагена, стимулирует регенерацию суставного хряща, уменьшает активность ферментов и тормозит катаболические процессы в хрящевой ткани.

#### Фармакокинетика

Исследования не проводились.

### Показания к применению:

Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов:

- гонартроз;
- артроз межфаланговых суставов;
- коксартроз;
- спондилез;
- спондилоартроз;
- менископатия;
- хондромаляция надколенника.

### **Относится к болезням:**

- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Спондилоартрит](#)
- [Хондрома](#)

### **Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- ревматоидный артрит;
- беременность и период лактации;
- возраст до 18 лет;
- применение у женщин репродуктивного возраста, не соблюдающих надежных методов контрацепции.

### **Способ применения и дозы:**

Внутримышечно.

Препарат вводят глубоко внутримышечно: в первый день - 0,3 мл, во второй день - 0,5 мл, далее - по 1 мл (1 ампула) 3 раза в неделю в течение 5-6 недель. Повторный курс лечения - после консультации с врачом по той же схеме.

### **Побочное действие:**

Аллергические реакции (редко), анафилактические реакции, в том числе анафилактический шок.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка:**

Данные о передозировке препарата неизвестны.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Данные о применении препарата при беременности и в период грудного вскармливания отсутствуют. Применение при беременности и в период лактации не рекомендуется.

Женщинам репродуктивного возраста в период лечения препаратом Биартрин необходимо соблюдать надежные методы контрацепции.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Можно применять одновременно с нестероидными противовоспалительными препаратами и глюкокортикостероидами. При одновременном применении с непрямыми антикоагулянтами, антиагрегантными средствами и фибринолитиками возможно усиление их действия.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При одновременном применении с непрямыми антикоагулянтами, антиагрегантами, фибринолитиками необходим частый контроль показателей свертывания крови.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Сведений о влиянии на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами, требующими повышенной скорости психомоторных реакций, нет.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказано детям до 18 лет.

## **Условия хранения:**

В защищенном от света месте при температуре не выше 20°C. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности:**

5 лет.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Biartrin>