# Бифасам



## Код АТХ:

- D01AC10

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бифоназол

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Противогрибковое средство широкого спектра действия, производное имидазола. Механизм действия связывают с нарушением синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны гриба, что приводит к изменению ее структуры и свойств. Активен в отношении дерматофитов, дрожжеподобных (в т.ч. рода Candida), плесневых и других видов грибов (Malassezia furfur). Проявляет активность в отношении Corynebacterium minutissimum.

***Фармакокинетика***

Хорошо проникает в пораженные слои кожи. Абсорбция - 0.6-0.8%, концентрация в плазме крови не определяется. Через 6 ч после применения концентрация в коже достигает или во много раз превосходит минимальную эффективную концентрацию для основных грибов, вызывающих дерматомикозы. Определяется в коже в течение 36-48 ч.

## Показания к применению:

Лечение грибковых заболеваний, вызванных чувствительными к бифоназолу микроорганизмами: микроспория, трихофития гладкой кожи и волосистой части головы, фавус, руброфития, микозы стоп и кистей, онихомикозы, паховая эпидермофития, разноцветный лишай, эритразма, поверхностный кандидомикоз кожи, кандидомикоз ногтевых валиков, ногтей, гениталий; межпальцевая опрелость, гипергидроз стоп.

## Относится к болезням:

- Грибковые заболевания
- Лишай
- Разноцветный лишай
- Эпидермофития
- Эритразма

## Противопоказания:

Повышенная чувствительность к бифоназолу.

## Способ применения и дозы:

Индивидуальный, зависит от показаний и применяемой лекарственной формы.

## Побочное действие:

*Местные реакции:* редко - небольшое покраснение, раздражение кожи, ощущение жжения и покалывания. При лечении грибковых заболеваний ногтей возможны реакции по краям или на ложе ногтя (раздражение, покраснение, мацерация, шелушение, контактный дерматит).

У предрасположенных пациентов возможны аллергические реакции.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение в I триместре беременности возможно только по строгим показаниям.

## Особые указания и меры предосторожности:

Применять у грудных детей следует под контролем врача.

***Применение в детском возрасте***

Применять у грудных детей следует под контролем врача.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Bifasam