

[Бифасам](#)



Код АТХ:

- [D01AC10](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бифоназол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковое средство широкого спектра действия, производное имидазола. Механизм действия связывают с нарушением синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны гриба, что приводит к изменению ее структуры и свойств. Активен в отношении дерматофитов, дрожжеподобных (в т.ч. рода *Candida*), плесневых и других видов грибов (*Malassezia furfur*). Проявляет активность в отношении *Corynebacterium minutissimum*.

Фармакокинетика

Хорошо проникает в пораженные слои кожи. Абсорбция - 0.6-0.8%, концентрация в плазме крови не определяется. Через 6 ч после применения концентрация в коже достигает или во много раз превосходит минимальную эффективную концентрацию для основных грибов, вызывающих дерматомикозы. Определяется в коже в течение 36-48 ч.

Показания к применению:

Лечение грибковых заболеваний, вызванных чувствительными к бифоназолу микроорганизмами: микроспория, трихофития гладкой кожи и волосистой части головы, фавус, руброфития, микозы стоп и кистей, онихомикозы, паховая эпидермофития, разноцветный лишай, эритразма, поверхностный кандидомикоз кожи, кандидомикоз ногтевых валиков, ногтей, гениталий; межпальцевая опрелость, гипергидроз стоп.

Относится к болезням:

- [Грибковые заболевания](#)
- [Лишай](#)
- [Разноцветный лишай](#)
- [Эпидермофития](#)
- [Эритразма](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к бифоназолу.

Способ применения и дозы:

Индивидуальный, зависит от показаний и применяемой лекарственной формы.

Побочное действие:

Местные реакции: редко - небольшое покраснение, раздражение кожи, ощущение жжения и покалывания. При лечении грибковых заболеваний ногтей возможны реакции по краям или на ложе ногтя (раздражение, покраснение, мацерация, шелушение, контактный дерматит).

У предрасположенных пациентов возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение в I триместре беременности возможно только по строгим показаниям.

Особые указания и меры предосторожности:

Применять у грудных детей следует под контролем врача.

Применение в детском возрасте

Применять у грудных детей следует под контролем врача.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Bifasam>