

[Бифидумбактерин форте](#)



Код АТХ:

- [A07FA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бифидобактерии бифидум](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капсулы** твердые желатиновые, корпус - белого цвета, крышечка - голубого цвета; содержимое капсул - порошок от светло-серого до темно-серого цвета с черными частицами угля и возможными вкраплениями бежевого цвета, со слабым кисломолочным запахом.

	1 капс. (5 доз)
Bifidobacterium bifidum (сорбированные на активированном угле)	не менее 50 млн. КОЕ

Вспомогательные вещества: лактоза.

- 10 шт. - флаконы (1) - пачки картонные.
- 10 шт. - банки пластиковые (1) - пачки картонные.
- 18 шт. - флаконы (1) - пачки картонные.
- 18 шт. - банки пластиковые (1) - пачки картонные.
- 30 шт. - флаконы (1) - пачки картонные.
- 30 шт. - банки пластиковые (1) - пачки картонные.

◇ **Порошок для приема внутрь** от светло-серого до темно-серого цвета с черными частицами угля и возможными вкраплениями бежевого цвета, со слабым кисломолочным запахом.

	1 пак. (5 доз)
Bifidobacterium bifidum (сорбированные на активированном угле)	не менее 50 млн. КОЕ

Вспомогательные вещества: лактоза.

Пакеты из многослойного металлополимерного материала (10) - пачки картонные.
Пакеты из многослойного металлополимерного материала (30) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат биологического происхождения, регулирующий равновесие кишечной микрофлоры, пробиотик.

Действие препарата обусловлено высокой концентрацией сорбированных на частицах активированного угля бифидобактерий, являющихся антагонистами широкого спектра патогенных (в т.ч. *Shigella* spp., *Salmonella* spp., *Staphylococcus aureus*) и условно патогенных микроорганизмов (в т.ч. *Proteus* spp., *Klebsiella* spp.).

Бифидобактерии, сорбированные на специально подготовленном носителе, обеспечивают повышенную клиническую эффективность, быстрое восстановление нормальной микрофлоры. Микрофлора, являясь естественным биосорбентом, аккумулирует в значительном количестве попадающие извне или образующиеся в организме токсические вещества и разлагает их на нетоксические компоненты. Сорбированные бифидобактерии, образуя микроколонию, усиленно активизируют восстановительные и метаболические процессы, пристеночное пищеварение, синтез витаминов и аминокислот, иммунную защиту организма.

Показания к применению:

В качестве монотерапии или в составе комплексной терапии:

- дисбактериоз кишечника;
 - острые кишечные инфекции установленной (шигеллез, сальмонеллез, стафилококковый энтероколит, ротавирусная инфекция) и неустановленной этиологии;
 - пищевые токсикоинфекции;
 - ОРВИ;
 - хронические заболевания с поражением ЖКТ (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит, холецистит, заболевания печени и желчевыводящих путей), сопровождающиеся дисбактериозом кишечника;
 - хронические запоры;
 - синдром мальабсорбции;
 - аллергические заболевания, сопровождающиеся дисбактериозом кишечника;
 - пневмония, острые и хронический бронхит, воспалительные заболевания урогенитального тракта, сопровождающиеся дисбактериозом кишечника;
 - дисбактериоз кишечника, вызванный приемом антибиотиков, антибактериальных препаратов, гормонов, НПВС;
 - диарея у пациентов, получавших длительное лечение антибиотиками и другими антибактериальными препаратами;
 - коррекция микробиоценоза кишечника и профилактика гнойно-воспалительных заболеваний у больных хирургического профиля в период предоперационной подготовки и после операций на кишечнике, печени, поджелудочной железе.
- С целью профилактики:
- внутригоспитальных инфекций в родильных домах и больницах;
 - дисбактериозов у часто болеющих ОРВИ детей и взрослых.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Диарея](#)
- [Дисбактериоз](#)
- [Дисбактериоз кишечника](#)
- [Запор](#)
- [Инфекции](#)
- [Пневмония](#)
- [Ротавирусная инфекция](#)
- [Сальмонеллез](#)
- [Токсикоз](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)
- [Шигеллез](#)
- [Энтерит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

— индивидуальная непереносимость препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь во время приема пищи, при необходимости - независимо от приема пищи.

Препарат в форме **капсул** назначают **взрослым и детям в возрасте 3 лет и старше**. Капсулы принимают, запивая кипяченой водой или кисломолочным продуктом. Для детей при необходимости капсулы вскрывают, и смешивают ее содержимое с жидкой пищей, предпочтительно с кисломолочным продуктом. Содержимое капсулы можно смешать с 20-50 мл кипяченой воды комнатной температуры, при этом образуется мутная взвесь с частичками сорбента черного цвета. Полученную водную взвесь следует выпить, не добиваясь полного растворения.

Препарат в форме **порошка для приема внутрь** назначают **взрослым и детям всех возрастных групп**. Порошок перед употреблением смешивают с жидкой пищей, предпочтительно с кисломолочным продуктом, для новорожденных и грудных детей - с материнским молоком или смесью для искусственного вскармливания. Порошок можно смешать с 30-50 мл кипяченой воды комнатной температуры, при этом образуется мутная взвесь с частичками сорбента черного цвета. Полученную водную взвесь следует выпить, не добиваясь полного растворения.

В зависимости от тяжести заболеваний Бифидумбактерин форте применяют в обычных или увеличенных дозах.

С целью лечения препарат в обычных дозах назначают **пациентам всех возрастных групп**.

Обычная доза для **взрослых** составляет по 2 капсулы или по 2 пакетика 2-3 раза/сут; для **детей в возрасте 3 лет и старше** - по 1 капсуле 3-4 раза/сут, **в возрасте 1 года и старше** - по 1 пакетик 3-4 раза/сут, **в возрасте до 1 года** - по 1 пакетик 2-3 раза/сут.

Курс лечения при **острых кишечных инфекциях и пищевых токсикоинфекциях** составляет 5-7 дней, при **других заболеваниях** - 15-21 день, в зависимости от характера и тяжести заболевания. При необходимости курсы лечения можно повторить 2-3 раза, каждый курс проводится через месяц после окончания предыдущего курса лечения.

При **хирургической патологии** препарат применяют в течение 3-5 дней *до операции* и в течение 10-15 дней *после операции*: **взрослым** назначают по 2 капсулы или по 2 пакетика 3 раза/сут; **детям в возрасте 3 лет и старше** - по 1 капсуле 3-4 раза/сут, **в возрасте 1 года и старше** - по 1 пакетик 3-4 раза/сут, **в возрасте до 1 года** - по 1 пакетик 3 раза/сут.

С целью лечения препарат в увеличенных дозах назначают **взрослым и детям в возрасте 1 года и старше**.

При **острой кишечной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции** препарат назначают с первых суток заболевания: **взрослым** - по 10 капсул или по 10 пакетиков 3 раза/сут; **детям в возрасте 3 лет и старше** - по 3-5 капсул каждые 2 ч до 6 раз/сут, **в возрасте 1 года и старше** - по 5 пакетиков 6 раз/сут. Курс лечения составляет 1-3 дня, в зависимости от тяжести состояния.

При **хронических заболеваниях ЖКТ** назначают **взрослым** по 10 капсул или 10 пакетиков 1-3 раза/сут; **детям в возрасте 3 лет и старше** - по 5 капсул 1-3 раза/сут, **в возрасте 1 года и старше** - по 5 пакетиков 1-3 раза/сут. Курс лечения составляет 10-14 дней.

При применении у детей капсулы рекомендуется вскрывать и смешивать их содержимое с 50 мл кипяченой воды комнатной температуры.

С целью профилактики Бифидумбактерин форте назначают **взрослым и детям старше 3 лет** по 1-2 капсулы или по

Бифидумбактерин форте

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

1-2 пакетика 1-2 раза/сут; **детям в возрасте до 1 года** - по 1 пакету 1 раз/сут. Профилактический курс составляет 10-15 дней 2-3 раза/год. Для профилактики внутрибольничных инфекций в родильных домах и больницах препарат применяют 5-10 дней.

Побочное действие:

При применении по показаниям в рекомендуемых дозах побочное действие препарата не установлено.

Передозировка:

Передозировка препарата Бифидумбактерин форте невозможна в связи с отсутствием кумулятивного действия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат разрешен для применения при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном приеме с витаминами (особенно группы В) действие препарата усиливается.

При приеме с антибиотиками возможно снижение терапевтической эффективности препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует применять препарат при лактазной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Препарат применяют у детей (см. Режим дозирования).

Условия хранения:

Пакеты следует хранить при температуре не выше 10°C. Нижняя граница температуры не лимитируется. Транспортирование осуществляется при температуре не выше 10°C; допускается транспортирование при температуре до 20°C не более 10 сут. Капсулы следует хранить при температуре от 2° до 10°C. Срок годности - 1 год.

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bifidumbakterin_forte