Бифидумбактерин форте



Код АТХ:

- A07FA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бифидобактерии бифидум

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы*** твердые желатиновые, корпус - белого цвета, крышечка - голубого цвета; содержимое капсул - порошок от светло-серого до темно-серого цвета с черными частицами угля и возможными вкраплениями бежевого цвета, со слабым кисломолочным запахом.

	1 капс. (5 доз)
Bifidobacterium bifidum (сорбированные на активированном угле)	не менее 50 млн. КОЕ

Вспомогательные вещества: лактоза.

10 шт. - флаконы (1) - пачки картонные.
10 шт. - банки пластиковые (1) - пачки картонные.
18 шт. - флаконы (1) - пачки картонные.
18 шт. - банки пластиковые (1) - пачки картонные.
30 шт. - флаконы (1) - пачки картонные.
30 шт. - банки пластиковые (1) - пачки картонные.

◊ ***Порошок для приема внутрь*** от светло-серого до темно-серого цвета с черными частицами угля и возможными вкраплениями бежевого цвета, со слабым кисломолочным запахом.

	1 пак. (5 доз)
Bifidobacterium bifidum (сорбированные на активированном угле)	не менее 50 млн. КОЕ

Вспомогательные вещества: лактоза.

Пакеты из многослойного металлополимерного материала (10) - пачки картонные.
Пакеты из многослойного металлополимерного материала (30) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат биологического происхождения, регулирующий равновесие кишечной микрофлоры, пробиотик.

Действие препарата обусловлено высокой концентрацией сорбированных на частицах активированного угля бифидобактерий, являющихся антагонистами широкого спектра патогенных (в т.ч. Shigella spp., Salmonella spp., Staphylococcus aureus) и условно патогенных микроорганизмов (в т.ч. Proteus spp., Klebsiella spp.).

Бифидобактерии, сорбированные на специально подготовленном носителе, обеспечивают повышенную клиническую эффективность, быстрое восстановление нормальной микрофлоры. Микрофлора, являясь естественным биосорбентом, аккумулирует в значительном количестве попадающие извне или образующиеся в организме токсические вещества и разлагает их на нетоксические компоненты. Сорбированные бифидобактерии, образуя микроколонии, усиленно активизируют восстановительные и метаболические процессы, пристеночное пищеварение, синтез витаминов и аминокислот, иммунную защиту организма.

Показания к применению:

В качестве монотерапии или в составе комплексной терапии:

— дисбактериоз кишечника;

— острые кишечные инфекции установленной (шигеллез, сальмонеллез, стафилококковый энтероколит, ротавирусная инфекция) и неустановленной этиологии;

— пищевые токсикоинфекции;

— ОРВИ;

— хронические заболевания с поражением ЖКТ (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит, холецистит, заболевания печени и желчевыводящих путей), сопровождающиеся дисбактериозом кишечника;

— хронические запоры;

— синдром мальабсорбции;

— аллергические заболевания, сопровождающиеся дисбактериозом кишечника;

— пневмония, острые и хронический бронхит, воспалительные заболевания урогенитального тракта, сопровождающиеся дисбактериозом кишечника;

— дисбактериоз кишечника, вызванный приемом антибиотиков, антибактериальных препаратов, гормонов, НПВС;

— диарея у пациентов, получавших длительное лечение антибиотиками и другими антибактериальными препаратами;

— коррекция микробиоценоза кишечника и профилактика гнойно-воспалительных заболеваний у больных хирургического профиля в период предоперационной подготовки и после операций на кишечнике, печени, поджелудочной железе.

С целью профилактики:

— внутригоспитальных инфекций в родильных домах и больницах;

— дисбактериозов у часто болеющих ОРВИ детей и взрослых.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Диарея
- Дисбактериоз
- Дисбактериоз кишечника
- Запор
- Инфекции
- Пневмония
- Ротавирусная инфекция
- Сальмонеллез
- Токсикоз
- Холера
- Холецистит
- Шигеллез
- Энтерит
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

— индивидуальная непереносимость препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь во время приема пищи, при необходимости - независимо от приема пищи.

Препарат в форме **капсул** назначают **взрослым и детям в возрасте 3 лет и старше**. Капсулы принимают, запивая кипяченой водой или кисломолочным продуктом. Для детей при необходимости капсулы вскрывают, и смешивают ее содержимое с жидкой пищей, предпочтительно с кисломолочным продуктом. Содержимое капсулы можно смешать с 20-50 мл кипяченой воды комнатной температуры, при этом образуется мутная взвесь с частичками сорбента черного цвета. Полученную водную взвесь следует выпить, не добиваясь полного растворения.

Препарат в форме **порошка для приема внутрь** назначают **взрослым и детям всех возрастных групп**. Порошок перед употреблением смешивают с жидкой пищей, предпочтительно с кисломолочным продуктом, для новорожденных и грудных детей - с материнским молоком или смесью для искусственного вскармливания. Порошок можно смешать с 30-50 мл кипяченой воды комнатной температуры, при этом образуется мутная взвесь с частичками сорбента черного цвета. Полученную водную взвесь следует выпить, не добиваясь полного растворения.

В зависимости от тяжести заболеваний Бифидумбактерин форте применяют в обычных или увеличенных дозах.

С целью лечения препарат в обычных дозах назначают **пациентам всех возрастных групп.**

Обычная доза для **взрослых** составляет по 2 капсулы или по 2 пакетика 2-3 раза/сут; для **детей в возрасте 3 лет и старше** - по 1 капсуле 3-4 раза/сут, **в возрасте 1 года и старше** - по 1 пакетику 3-4 раза/сут, **в возрасте до 1 года** - по 1 пакетику 2-3 раза/сут.

Курс лечения *при острых кишечных инфекциях и пищевых токсикоинфекциях* составляет 5-7 дней, *при других заболеваниях* - 15-21 день, в зависимости от характера и тяжести заболевания. При необходимости курсы лечения можно повторить 2-3 раза, каждый курс проводится через месяц после окончания предыдущего курса лечения.

При хирургической патологии препарат применяют в течение 3-5 дней *до операции* и в течение 10-15 дней *после операции*: **взрослым** назначают по 2 капсулы или по 2 пакетика 3 раза/сут; **детям в возрасте 3 лет и старше** - по 1 капсуле 3-4 раза/сут, **в возрасте 1 года и старше** - по 1 пакетику 3-4 раза/сут, **в возрасте до 1 года** - по 1 пакетику 3 раза/сут.

С целью лечения препарат в увеличенных дозах назначают **взрослым и детям в возрасте 1 года и старше.**

При *острой кишечной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции* препарат назначают с первых суток заболевания: **взрослым** - по 10 капсул или по 10 пакетиков 3 раза/сут; **детям в возрасте 3 лет и старше** - по 3-5 капсул каждые 2 ч до 6 раз/сут, **в возрасте 1 года и старше** - по 5 пакетиков 6 раз/сут. Курс лечения составляет 1-3 дня, в зависимости от тяжести состояния.

При *хронических заболеваниях ЖКТ* назначают **взрослым** по 10 капсул или 10 пакетиков 1-3 раза/сут; **детям в возрасте 3 лет и старше** - по 5 капсул 1-3 раза/сут, **в возрасте 1 года и старше** - по 5 пакетиков 1-3 раза/сут. Курс лечения составляет 10-14 дней.

При применении у детей капсулы рекомендуется вскрывать и смешивать их содержимое с 50 мл кипяченой воды комнатной температуры.

С целью профилактики Бифидумбактерин форте назначают **взрослым и детям старше 3 лет** по 1-2 капсулы или по

1-2 пакетика 1-2 раза/сут; **детям в возрасте до 1 года** - по 1 пакетику 1 раз/сут. Профилактический курс составляет 10-15 дней 2-3 раза/год. Для профилактики внутрибольничных инфекций в родильных домах и больницах препарат применяют 5-10 дней.

Побочное действие:

При применении по показаниям в рекомендуемых дозах побочное действие препарата не установлено.

Передозировка:

Передозировка препарата Бифидумбактерин форте невозможна в связи с отсутствием кумулятивного действия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат разрешен для применения при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном приеме с витаминами (особенно группы В) действие препарата усиливается.

При приеме с антибиотиками возможно снижение терапевтической эффективности препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует применять препарат при лактазной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Препарат применяют у детей (см. Режим дозирования).

Условия хранения:

Пакеты следует хранить при температуре не выше 10°С. Нижняя граница температуры не лимитируется. Транспортирование осуществляется при температуре не выше 10°С; допускается транспортирование при температуре до 20°С не более 10 сут. Капсулы следует хранить при температуре от 2° до 10°С. Срок годности - 1 год.

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bifidumbakterin_forte