Бифидумбактерин (свечи)



Код АТХ:

- A07FA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бифидобактерии бифидум

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Суппозитории ректальные и вагинальные***	**1 супп.**
бифидобактерии бифидум (Bifidobacterium bifidum)	не менее 1×10^7 КОЕ

Вспомогательные вещества: витепсол H-15 - 45.06-49.8%, витепсол W-35 - 45.06-49.8%, парафин жидкий - 4.75-5.25%, компоненты среды высушивания: сахароза - 0.12-0.13%, желатин - 0.01-0.02%.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Живые бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum) обладают высокой антагонистической активностью в отношении широкого спектра патогенных и условно патогенных микроорганизмов, включая стафилококки, протей, энтеропатогенную и гемолитическую кишечные палочки, шигеллы, дрожжеподобные грибы, что определяет нормализующее влияние препарата при нарушениях микробиоцеиоза кишечника и влагалища.

Антагонистическое воздействие на патогенную и условно патогенную микрофлору способствует восстановлению нормальной микрофлоры.

Фармакокинетика

Не всасывается в кровоток.

Показания к применению:

Лечение и профилактика дисбактериозов и воспалительных процессов дистальных отделов кишечника (взрослые и дети с 3 лет):

— хронические колиты различной этиологии с локализацией патологического процесса в дистальных отделах толстой кишки;

— дисбактериоз кишечника, в т.ч. восстановление микрофлоры кишечника у пациентов, перенесших острые кишечные инфекции и антибактериальную терапию.

Лечение и профилактика дисбиозов влагалища и воспалительных процессов женских половых органов (взрослые):

— неспецифические вагиниты (кольпиты), не гонококковой и трихомонадной этиологии; дисбиозы влагалища, в т.ч. бактериальный вагиноз (гарднереллез); кандидоз влагалища - для восстановления нормальной микрофлоры после окончания специфической антимикробной, противовирусной или противогрибковой терапии, в качестве монопрепарата или в комплексе с иммуномодулирующими препаратами;

— подострые и хронические стадии воспалительных процессов женской половой сферы; назначают после окончания курса антибактериальной терапии с целью нормализации микрофлоры;

— гормонально-зависимые кольпиты (вагиниты), в т.ч. сенильные; назначают на фоне заместительной гормональной терапии;

— подготовка к плановым гинекологическим операциям с целью профилактики послеоперационных инфекционных осложнений;

— предродовая подготовка беременных группы риска по развитию воспалительных заболеваний с нарушением чистоты влагалищного секрета III-IV степени с целью профилактики и лечения дисбиозов влагалища;

— в комплексном лечении урогенитальных инфекций и иных заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП): гонореи, урогенитального хламидиоза, урогенитального герпеса.

Относится к болезням:

- Вагинит
- Герпес
- Гонорея
- Дисбактериоз
- Дисбактериоз кишечника
- Инфекции
- Колит
- Кольпит
- Кольпит

Противопоказания:

Не установлены, кроме индивидуальной непереносимости препарата.

Способ применения и дозы:

При кишечных заболеваниях **(детям старше 3 лет и взрослым)**

Суппозитории применяют рсктально 3 раза в день по 1 - 2 суппозитория на прием одновременно с приемом пероральных форм препаратов с группировочным наименованием бифидобактерии бифидум. Продолжительность курса лечения: после острых кишечных инфекций составляет 7-10 дней, при затяжных и хронических формах заболевания, дисбактериозах кишечника 15-30 дней и более.

При обнаружении гемолизирующей кишечной палочки (E.coli enterohemorrhagic) препарат вводят по 1 суппозиторию 1 - 2 раза в день в течение 10 дней.

При необходимости курсы лечения можно повторить через 3-4 месяца.

Для восстановительной терапии при применении антибактериальных препаратов и профилактики колитов препарат вводят по 1 суппозиторию 1-2 раза в день в течение 10 дней. При необходимости курс лечения можно повторить через 10-20 дней.

В гинекологической практике **(взрослым)**

Неспецифические кольпиты (вагиниты), в том числе сенильные вагиниты гормональной природы, дисбиозы влагалища и другие: назначают вагинально по 1 суппозиторию 2 раза в день в течение 5 - 10 дней.

При нарушении чистоты вагинального секрета у беременных до III-IV степени препарат применяют по 1 суппозиторию 1 - 2 раза в день в течение 5-10 и более дней под контролем восстановления чистоты вагинального секрета до I-II степени и исчезновения клинических симптомов.

С целью профилактики гнойно-септических осложнений при плановых гинекологических операциях применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в день в течение 5-10 дней до и 10 дней после операции или родоразрешения.

В комплексном лечении урогенитальных инфекций и иных ЗППП препарат применяют по 1 суппозиторию 3 раза в день, курс лечения 15 дней.

Восстановительная терапия после применения антибиотиков: препарат вводят по 1 суппозиторию I - 2 раза в день в течение 10 дней.

Перед применением надрезают ячейковую упаковку.

Побочное действие:

Возможно развитие аллергических реакций.

Передозировка:

Случаев передозировки не наблюдалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Бифидобактерии являются представителями нормальной микрофлоры человека. Препараты, изготовленные на их основе, могут применяться в период беременности и грудного вскармливания. Особых условий приема нет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Бифидумбактерин, суппозитории ректальные и вагинальные, можно применять одновременно с противовирусными и иммуномодулирующими лекарственными препаратами в соответствии с их назначениями и возрастными дозами. Рекомендованный интервал между приемом антибактериальных препаратов и применением Бифидумбактерина, суппозитории ректальные и вагинальные, составляет 3-4 часа. Рекомендуется одновременное применение суппозиториев и пероральных форм бифидосодержащих препаратов с группировочным наименованием бифидобактерии бифидум (Бифидумбактерин. порошок для приема внутрь и местного применения. Бифидумбактерин форте, Пробифор).

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 2 до 10°С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности - 1 год.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.