

[Бифидумбактерин \(таблетки\)](#)



Код АТХ:

- [A07FA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бифидобактерии бифидум](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Живые бифидобактерии обладают высокой антагонистической активностью против широкого спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов кишечника (включая стафилококки, протей, энтеропатогенную кишечную палочку, шигеллы, некоторые дрожжеподобные грибы), восстанавливают равновесие кишечной и влагалищной микрофлоры, нормализуют пищеварительную и защитную функции кишечника, активизируют обменные процессы, повышают неспецифическую резистентность организма.

Показания к применению:

Для приема внутрь

— профилактика и лечение дисбактериоза ЖКТ различной этиологии (в т.ч. при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатите, холецистите, гепатите, аллергических заболеваниях, назначении противомикробных препаратов, гормонов и НПВП);

— острые кишечные инфекции (шигеллез, сальмонеллез, стафилококковый энтероколит, ротавирусная инфекция), пищевая токсикоинфекция, синдром мальабсорбции, хронические запоры или диарея на фоне длительной антибактериальной терапии;

— коррекция микробиоценоза перед и после операций на кишечнике, печени, поджелудочной железе;

— профилактика госпитальной инфекции и дисбактериоза у пациентов, часто болеющих ОРВИ.

Для местного, интравагинального и ректального применения

— дисбактериоз урогенитального тракта, острые и хронические воспалительные заболевания урогенитального тракта (включая урогенитальные инфекции, передающиеся половым путем - гонорею, урогенитальный хламидиоз, генитальный герпес);

— бактериальный вагиноз (гарднереллез);

— неспецифический кольпит (включая гормонозависимый кольпит - сенильный);

— хронический колит различной этиологии, дисфункция кишечника после перенесенной острой кишечной инфекции;

— подготовка к плановым гинекологическим операциям (для профилактики послеоперационных инфекционных осложнений);

— предродовая подготовка беременных женщин группы риска в отношении воспалительных заболеваний (для профилактики и лечения дисбактериоза влагалища).

Лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения применяется для профилактики мастита у кормящих матерей группы риска.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Вагинит](#)
- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Герпес](#)
- [Гонорея](#)
- [Дисбактериоз](#)
- [Запор](#)
- [Инфекции](#)
- [Колит](#)
- [Кольпит](#)
- [Кольпит](#)
- [Мастит](#)
- [Панкреатит](#)
- [Сальмонеллез](#)
- [Токсикоз](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)
- [Шигеллез](#)
- [Энтерит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

— детский возраст до 3 лет (для суппозиториев);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Для приема внутрь за 20-30 мин до еды или во время еды (грудным детям можно давать непосредственно перед кормлением, предварительно растворив лиофилизат).

Больным с хирургической патологией - за 3-5 дней до операции и в течение 10-15 дней после нее - по 15-30 доз/сут.

Хронические заболевания ЖКТ: (увеличенные дозы) по 25-50 доз 1-3 раза/сут; курс лечения - 10-14 дней.

Суппозиторий содержит 1 дозу бифидобактерий бифидум. При *кишечных заболеваниях* - ректально, по 1-2 суппозитория 3 раза/сут в сочетании с приемом пероральных форм за 20-30 мин до еды по 5 доз 1-2 раза/сут. Продолжительность лечения после острых кишечных инфекций - 7-10 дней, при затяжных и хронических формах - 15-30 дней и более.

В *гинекологической практике* - интравагинально, по 1 суппозиторию 2 раза/сут в течение 5-10 дней.

При *нарушении чистоты влагалищного секрета у беременных до III-IV ст.* - по 1 суппозиторию 1-2 раза/сут в течение 5-10 дней и более, под контролем восстановления чистоты влагалищного секрета до I-II ст. и исчезновения

клинических симптомов.

С целью профилактики гнойно-септических осложнений при плановых гинекологических операциях - интравагинально, по 1 суппозиторию 1-2 раза/сут в течение 5-10 дней до предполагаемой операции или родоразрешения.

После антибиотикотерапии - интравагинально, по 1 суппозиторию 1-2 раза/сут в течение 10 дней. При необходимости курс можно повторить через 3-4 мес.

Лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения (в виде орошений, аппликаций, примочек) применяют при урогенитальном дисбактериозе - интравагинально, на 2-3 ч вводят тампон, обильно смоченный в растворе (5-10 доз растворяют в 15-20 мл кипяченой воды комнатной температуры); курс лечения - 8-10 дней.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применяется по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Действие препарата усиливают витамины (особенно группы В), снижают - антибиотики.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется одновременное применение пероральных форм с антибиотиками, а также растворение препарата в горячей воде (выше 40°) и хранение его в растворенном виде.

Применение суппозиториев можно сочетать с одновременным назначением антибактериальных, противовирусных и иммуностимулирующих лекарственных средств.

Не пригодны к применению суппозитории, имеющие запах прогорклого масла или с нарушенной упаковкой.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 3 лет (для суппозиториев).

Источник: http://drugs.thead.ru/Bifidumbakterin_tabletki