

## Бифиформ



### Код АТХ:

- [A07FA](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бифидобактерии лонгум](#)
- [Энтерококкус фециум](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Капсулы кишечнорастворимые** твердые желатиновые.

	<b>1 капс.</b>
Bifidobacterium longum	не менее 10 <sup>7</sup>
Enterococcus faecium	не менее 10 <sup>7</sup>

30 шт. - пеналы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Эубиотик. Штаммы *Enterococcus faecium* и *Bifidobacterium longum*, входящие в состав препарата, являются естественными симбиотическими бактериями, населяющими ЖКТ. Препарат оказывает нормализующее действие на количественный и качественный состав микрофлоры кишечника. Действие обусловлено как непосредственным прямым эффектом входящих в состав препарата компонентов (высокая антагонистическая активность в отношении патогенных и условно патогенных микроорганизмов), так и опосредованным - стимуляция местного кишечного звена иммунитета (активация синтеза иммуноглобулина А, индукция синтеза эндогенного интерферона).

*Bifidobacterium longum* обладает высокой выживаемостью в кишечнике человека и высокой скоростью роста. Включение в препарат апатогенного энтерококка *Enterococcus faecium*, колонизирующего в норме тонкий кишечник, позволяет оказывать положительное воздействие на состояние и пищеварительные функции не только толстого, но и тонкого кишечника, особенно при наличии бродильной диспепсии и явлений метеоризма.

## Показания к применению:

- диарея, вызванная острым и обострением хронического гастроэнтерита, ротавирусной инфекцией;
- антибиотик-ассоциированная диарея;
- диарея путешественника;
- в комплексной терапии острых кишечных инфекций;
- в комплексной терапии хронических заболеваний ЖКТ, таких как колит, синдром раздраженного кишечника и других желудочно-кишечных расстройств функционального генеза;
- нормализация микрофлоры кишечника, лечение и профилактика дисбактериозов и поддержание иммунной системы у детей старше 2-х лет и взрослых;
- непереносимость лактозы;
- в составе комплексной стандартной эрадикационной терапии у пациентов с хеликобактерной инфекцией.

## Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Гастроэнтерит](#)
- [Диарея](#)
- [Дисбактериоз](#)
- [Инфекции](#)
- [Колит](#)
- [Ротавирусная инфекция](#)
- [Синдром раздраженного кишечника](#)

## Противопоказания:

- индивидуальная гиперчувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

При *острой диарее* препарат необходимо принимать по 1 капсуле 4 раза в день до нормализации стула. Затем прием препарата необходимо продолжить в дозе 2-3 капсулы в сутки до полного исчезновения симптомов.

Для *нормализации микрофлоры кишечника* и поддержки иммунной системы препарат назначают в дозе 2-3 капсулы в сутки 10-21 день.

Пациентам с *непереносимостью лактозы* рекомендуется принимать препарат по 1 капсуле 3 раза в сутки.

При проведении *эрадикационной терапии* Бифиформ назначают по 2 капсулы 2 раза в день на протяжении двух недель с первого дня эрадикационной терапии.

**Детям с 2-х лет** по 1 капсуле 2-3 раза в день. Если ребенок не может проглотить капсулу, ее необходимо вскрыть и смешать содержимое с небольшим количеством жидкости.

## Побочное действие:

При применении в рекомендуемых дозах по установленным показаниям побочные эффекты не выявлены.

## Передозировка:

Симптомы передозировки ранее не зарегистрированы. В случае значительного превышения рекомендуемых доз целесообразно медицинское наблюдение.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

## **Бифиформ**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Применение препарата Бифиформ в период беременности и лактации считается безопасным, поскольку препарат не всасывается и не оказывает системного действия.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Препарат может быть использован в сочетании с другими лекарственными препаратами. Разрешается одновременное назначение с антибиотиками.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Меры предосторожности: не следует превышать максимальную суточную дозу.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами.

#### ***Применение в детском возрасте***

Назначают детям с 2 лет.

### **Условия хранения:**

В сухом месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Biform>