Бифиформ



Код АТХ:

- A07FA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бифидобактерии лонгум
- Энтерококкус фециум

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы кишечнорастворимые*** твердые желатиновые.

	1 капс.
Bifidobacterium longum	не менее 10^7
Enterococcus faecium	не менее 10^7

30 шт. - пеналы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Эубиотик. Штаммы Enterococcus faecium и Bifidobacterium longum, входящие в состав препарата, являются естественными симбиотическими бактериями, населяющими ЖКТ. Препарат оказывает нормализующее действие на количественный и качественный состав микрофлоры кишечника. Действие обусловлено как непосредственным прямым эффектом входящих в состав препарата компонентов (высокая антагонистическая активность в отношении патогенных и условно патогенных микроорганизмов), так и опосредованным - стимуляция местного кишечного звена иммунитета (активация синтеза иммуноглобулина А, индукция синтеза эндогенного интерферона).

Bifidobacterium longum обладает высокой выживаемостью в кишечнике человека и высокой скоростью роста. Включение в препарат апатогенного энтерококка Enterococcus faecium, колонизирующего в норме тонкий кишечник, позволяет оказывать положительное воздействие на состояние и пищеварительные функции не только толстого, но и тонкого кишечника, особенно при наличии бродильной диспепсии и явлений метеоризма.

Показания к применению:

— диарея, вызванная острым и обострением хронического гастроэнтерита, ротавирусной инфекцией;

— антибиотик-ассоциированная диарея;

— диарея путешественника;

— в комплексной терапии острых кишечных инфекций;

— в комплексной терапии хронических заболеваний ЖКТ, таких как колит, синдром раздраженного кишечника и других желудочно-кишечных расстройств функционального генеза;

— нормализация микрофлоры кишечника, лечение и профилактика дисбактериозов и поддержание иммунной системы у детей старше 2-х лет и взрослых;

— непереносимость лактозы;

— в составе комплексной стандартной эрадикационной терапии у пациентов с хеликобактерной инфекцией.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Гастроэнтерит
- Диарея
- Дисбактериоз
- Инфекции
- Колит
- Ротавирусная инфекция
- Синдром раздраженного кишечника

Противопоказания:

— индивидуальная гиперчувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

При *острой диарее* препарат необходимо принимать по 1 капсуле 4 раза в день до нормализации стула. Затем прием препарата необходимо продолжить в дозе 2-3 капсулы в сутки до полного исчезновения симптомов.

Для *нормализации микрофлоры кишечника* и поддержки иммунной системы препарат назначают в дозе 2-3 капсулы в сутки 10-21 день.

Пациентам с *непереносимостью лактозы* рекомендуется принимать препарат по 1 капсуле 3 раза в сутки.

При проведении *эрадикационной терапии* Бифиформ назначают по 2 капсулы 2 раза в день на протяжении двух недель с первого дня эрадикационной терапии.

Детям с 2-х лет по 1 капсуле 2-3 раза в день. Если ребенок не может проглотить капсулу, ее необходимо вскрыть и смешать содержимое с небольшим количеством жидкости.

Побочное действие:

При применении в рекомендуемых дозах по установленным показаниям побочные эффекты не выявлены.

Передозировка:

Симптомы передозировки ранее не зарегистрированы. В случае значительного превышения рекомендуемых доз целесообразно медицинское наблюдение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата Бифиформ в период беременности и лактации считается безопасным, поскольку препарат не всасывается и не оказывает системного действия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат может быть использован в сочетании с другими лекарственными препаратами. Разрешается одновременное назначение с антибиотиками.

Особые указания и меры предосторожности:

Меры предосторожности: не следует превышать максимальную суточную дозу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами.

Применение в детском возрасте

Назначают детям с 2 лет.

Условия хранения:

В сухом месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bifiform