Бификол



Код АТХ:

- A07FA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бифидобактерии бифидум
- Кишечные палочки

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает антагонистической активностью в отношении многих патогенных и условно–патогенных микроорганизмов.

Показания к применению:

Дисбактериоз ЖКТ, в т.ч. на фоне:

— кишечных инфекций (дизентерии, сальмонеллеза, вирусной диареи);

— воспалительных заболеваний ЖКТ (колита, энтероколита, неспецифического язвенного колита);

— в период реконвалесценции после химиотерапии.

Относится к болезням:

- Диарея
- Дизентерия
- Инфекции
- Колит
- Реконвалесценция

- Сальмонеллез
- Энтерит

Противопоказания:

- сопутствующая антибиотикотерапия.

Способ применения и дозы:

Внутрь, за 20–30 мин до еды: **детям от 6 мес до 1 года** — 1 доза 2 раза/сут, **от 1 года до 3 лет** - 2–5 доз 2 раза/сут, **старше 3 лет и взрослым** – 3–5 доз 2 раза /сут. Курс лечения при *острых формах* - не менее 2 нед, в зависимости от клинических и лабораторных показателей — 3–4 нед; при *реконвалесценции* — 21–30 дней, при *постдизентерийном колите и длительной дисфункции кишечника* — не менее 4–6 нед, при хронических *колитах, энтероколитах и неспецифическом язвенном колите* до 45–60 дней. При необходимости можно назначать повторные курсы лечения или поддерживающие дозы (половина суточной дозы) в течение 1–1.5 мес.

Препарат разводят кипяченой водой комнатной температуры непосредственно перед приемом из расчета 1 ч.ложка воды на 1 дозу. Лицам с повышенной кислотностью рекомендуется за 5–10 мин до приема препарата выпить 1/2 стакана минеральной воды (боржом, ессентуки N4 или N17) или раствор гидрокарбоната натрия (1/2 ч.ложки на 1 стакан воды).

Побочное действие:

Не описаны.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bifikol