

Бификол



Код АТХ:

- [A07FA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бифидобактерии бифидум](#)
- [Кишечные палочки](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}

[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает антагонистической активностью в отношении многих патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.

Показания к применению:

Дисбактериоз ЖКТ, в т.ч. на фоне:

- кишечных инфекций (дизентерии, сальмонеллеза, вирусной диареи);
- воспалительных заболеваний ЖКТ (колита, энтероколита, неспецифического язвенного колита);
- в период реконвалесценции после химиотерапии.

Относится к болезням:

- [Диарея](#)
- [Дизентерия](#)
- [Инфекции](#)
- [Колит](#)
- [Реконвалесценция](#)

- [Сальмонеллез](#)
- [Энтерит](#)

Противопоказания:

- сопутствующая антибиотикотерапия.

Способ применения и дозы:

Внутрь, за 20-30 мин до еды: **детям от 6 мес до 1 года** — 1 доза 2 раза/сут, **от 1 года до 3 лет** - 2-5 доз 2 раза/сут, **старше 3 лет и взрослым** – 3-5 доз 2 раза /сут. Курс лечения при острых формах - не менее 2 нед, в зависимости от клинических и лабораторных показателей — 3-4 нед; при реконвалесценции — 21-30 дней, при постдизентерийном колите и длительной дисфункции кишечника — не менее 4-6 нед, при хронических колитах, энтероколитах и неспецифическом язвенном колите до 45-60 дней. При необходимости можно назначать повторные курсы лечения или поддерживающие дозы (половина суточной дозы) в течение 1-1.5 мес.

Препарат разводят кипяченой водой комнатной температуры непосредственно перед приемом из расчета 1 ч.ложка воды на 1 дозу. Лицам с повышенной кислотностью рекомендуется за 5-10 мин до приема препарата выпить 1/2 стакана минеральной воды (боржом, ессентуки N4 или N17) или раствор гидрокарбоната натрия (1/2 ч.ложки на 1 стакан воды).

Побочное действие:

Не описаны.

Особые указания и меры предосторожности:**Применение в детском возрасте**

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Bifikol>