

## [Бификол сухой](#)



### **Код АТХ:**

- [A07FA](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Бифидобактерии бифидум](#)
- [Кишечные палочки](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Обладает антагонистической активностью в отношении многих патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.

### **Показания к применению:**

Дисбактериоз ЖКТ, в т.ч. на фоне:

- кишечных инфекций (дизентерии, сальмонеллеза, вирусной диареи);
- воспалительных заболеваний ЖКТ (колита, энтероколита, неспецифического язвенного колита);
- в период реконвалесценции после химиотерапии.

### **Относится к болезням:**

- [Диарея](#)
- [Дизентерия](#)
- [Инфекции](#)
- [Колит](#)
- [Реконвалесценция](#)

- [Сальмонеллез](#)
- [Энтерит](#)

**Противопоказания:**

- сопутствующая антибиотикотерапия.

**Способ применения и дозы:**

Внутрь, за 20–30 мин до еды: **детям от 6 мес до 1 года** — 1 доза 2 раза/сут, **от 1 года до 3 лет** - 2–5 доз 2 раза/сут, **старше 3 лет и взрослым** - 3–5 доз 2 раза /сут. Курс лечения при *острых формах* - не менее 2 нед, в зависимости от клинических и лабораторных показателей — 3–4 нед; при *реконвалесценции* — 21–30 дней, при *постдизентерийном колите и длительной дисфункции кишечника* — не менее 4–6 нед, при *хронических колитах, энтероколитах и неспецифическом язвенном колите* до 45–60 дней. При необходимости можно назначать повторные курсы лечения или поддерживающие дозы (половина суточной дозы) в течение 1–1.5 мес.

Препарат разводят кипяченой водой комнатной температуры непосредственно перед приемом из расчета 1 ч.ложка воды на 1 дозу. Лицам с повышенной кислотностью рекомендуется за 5–10 мин до приема препарата выпить 1/2 стакана минеральной воды (боржом, эссенуки N4 или N17) или раствор гидрокарбоната натрия (1/2 ч.ложки на 1 стакан воды).

**Побочное действие:**

Не описаны.

**Особые указания и меры предосторожности:*****Применение в детском возрасте***

Применение возможно согласно режиму дозирования.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Bifikol\\_suhoy](http://drugs.thead.ru/Bifikol_suhoy)