Бифилакт-Билс (лиофилизат)



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения*** в виде кристаллической или пористой массы, различных оттенков бежевого или светло-коричневого цвета, со специфическим запахом.

	1 фл.
живые бактерии Lactobacillus plantarum 8P-A3	не менее 10^8
живые бактерии Lactobacillus acidophilus K_3III_{24}	не менее 10^7
живые бактерии Bifidobacterium bifidum 1	не менее 10^7

Вспомогательные вещества: компоненты защитной среды для высушивания* (желатин, сахароза (сахар), молоко).

* состав защитной среды для высушивания (на 1 л среды): желатин от 1.5% до 3%, сахароза (сахар) - от 5% до 20%, молоко сухое - от 8% до 25%, вода - до 1 л.

10 шт. - флаконы (10) - пачки картонные.
10 шт. - флаконы (10) - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат представляет собой микробную массу живых, антагонистически активных штаммов бактерий Lactobacillus plantarum 8P-A3, Lactobacillus acidophilus K_3III_{24} и Bifidobacterium bifidum 1, лиофилизированную в среде культивирования с добавлением защитной сахарозо-желатино-молочной среды.

Терапевтический эффект препарата обусловлен содержанием в нем живых лакто- и бнфидобактерий, которые обладают антагонистической активностью против широкого спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и тем самым восстанавливают равновесие кишечной и влагалищной микрофлоры, нормализуют пищеварительную и защитную функции кишечника, активизируют обменные процессы, повышают неспецифическую резистентность организма.

На фоне приема препарата отмечено достоверное увеличение количества лакто- и бифидобактерий, а также исчезновение или уменьшение клинических симптомов, характерных для дисбиоза ЖКТ и бактериального вагиноза.

Показания к применению:

Лечение дисбактериозов различной этиологии у лиц в возрасте от 18 до 60 лет:

— дисбактериоз кишечника, возникший как следствие длительной антибактериальной, гормональной, лучевой и другой терапии, при пребывании в экстремальных условиях;

— дисбактериоз кишечника на фоне острых кишечных инфекций или пищевых токсикоинфекций, а также у реконвалесцентов после перенесенных острых кишечных инфекций или пищевых токсикоинфекций;

— дисбактериоз кишечника при инфекционных и аллергических заболеваниях;

— дисбактериоз кишечника, возникающий на фоне острых и хронических заболеваний ЖКТ;

— другие заболевания или состояния, сопровождающиеся нарушением нормофлоры кишечника с дефицитом лакто- и бифидобактерий.

Лечение заболеваний, обусловленных нарушением баланса вагинальной микрофлоры у женщин старше 18 лет (назначается как самостоятельное средство и/или в составе комплексной терапии):

— неспецифические кольпиты (не связанные с гонококковой, трихомонадной и иной специфической инфекцией);

— дисбиозы влагалища, в т.ч. бактериальный вагиноз;

— гормонально-зависимые кольпиты;

— подострые и хронические стадии воспалительных процессов женской половой сферы (назначают после окончания курса антибактериальной терапии с целью нормализации микрофлоры);

— восстановление нормальной микрофлоры влагалища после специфической антимикробной, противовирусной и иммуномодулирующей терапии;

— другие заболевания или состояния, сопровождающиеся нарушением нормофлоры влагалища с дефицитом лакто- и бифидобактерий.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Баланит
- Вагинит
- Дисбактериоз
- Дисбактериоз кишечника
- Инфекции
- Кольпит
- Токсикоз

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных клинических исследований).

Не рекомендуется применять препарат при вульвовагинальных кандидозах.

Способ применения и дозы:

Бифилакт-БИЛС при кишечных заболеваниях применяют внутрь, а в акушерско-гинекологической практике - местно (интравагинально).

Внутрь

Растворение содержимого флакона осуществить следующим образом: в стакан налить примерно 25-50 мл кипяченой воды комнатной температуры; вскрыть флакон, удалив колпачок и пробку; из стакана перенести во флакон небольшое количество волы; после растворения (препарат растворяется в течение не более 5 мин с образованием гомогенной непрозрачной суспензии бежевого или светло-коричневого цвета) содержимое флакона перенести в тот же стакан и перемешать.

Растворенный препарат хранению не подлежит.

Препарат применяют внутрь за 30 мин до еды или через 1.5 ч после еды, запивая водой или молоком комнатной температуры. Рекомендуется применять Бифилакт-БИЛС по 2 флакона 3 раза/сут. Курс лечения 2-4 недели.

При необходимости курс лечения можно повторить 2-3 раза.

Местно (интравагинально)

Содержимое флакона растворить в 8-10 мл кипяченой воды комнатной температуры, стерильный тампон пропитать препаратом, ввести во влагалище и оставить на 2-3 ч. Назначают по 2 флакона 2 раза/сут в течение 7-12 дней.

Побочное действие:

Побочное действие препарата в ходе клинических исследований не установлено. У отдельных людей с измененной реактивностью могут развиваться аллергические реакции на компоненты препарата.

При появлении побочных действий, не упомянутых в инструкции, необходимо обратиться к лечащему врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Не пригоден к применению препарат во флаконах с нарушенной целостностью или нечеткой маркировкой, при изменении физических свойств (изменение цвета, сморщивание биомассы), при наличии посторонних включений.

Не рекомендуется растворение препарата в горячей воде (выше 40°С), а также употребление препарата одновременно с алкоголем, в связи со снижением его эффективности.

Содержание сахарозы (сахара) и молока незначительно и не превышает 0.1 хлебных единиц (ХЕ) в дозе препарата.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Сведения отсутствуют.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8°С. Срок годности - 18 мес.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bifilakt-Bils_liofilizat