

## Бифилиз (свечи)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Бифидобактерии бифидум](#)
- [Лизоцим](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр МНН](#) [МНН Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)англ

### **Форма выпуска:**

#### **Форма выпуска, описание и состав**

<input type="checkbox"/> Суппозитории для вагинального или ректального введения	1 супп.
бифидобактерии бифидум (Bifidobacterium bifidum)	не менее 10 млн.КОЕ
лизоцим	10 мг

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Терапевтический эффект Бифилиз суппозиториев обусловлен высокой антагонистической активностью бифидобактерий в отношении условно-патогенных и ряда патогенных микроорганизмов, что в сочетании с антибактериальным и противовоспалительным действием лизоцима создает благоприятные условия для нормализации микрофлоры кишечника и влагалища.

### **Показания к применению:**

Лечение дисбактериозов и воспалительных процессов влагалища. Повышение неспецифической резистентности организма у детей всех возрастных групп и взрослых. Применяют в составе комплексной терапии.

*Ректально взрослым и детям всех возрастных групп:*

- при острых кишечных инфекциях установленной (бактериальной, вирусной) и неустановленной этиологии в периоде реконвалесценции, для предупреждения бактерионосительства и перехода заболевания в хроническую форму;
- после токсицинфекций;
- при кишечном дисбактериозе различной этиологии;

- для повышения эффективности комплексного лечения неспецифических воспалительных заболеваний кишечника (хронический колит, энтероколит, проктит и пр.);
- для улучшения переносимости антибактериальной, цитостатической и других видов терапии.

**Вагинально взрослым:**

- при вагинальном дисбиозе различной этиологии (бактериальный вагиноз, неспецифический вагинит и пр.). Препарат применяют для восстановления нормальной микрофлоры в сочетании или после специфической антимикробной, противовирусной и иммуномодулирующей терапии;
- для лечения гинекологических заболеваний, осложненных вагинальной патологией (хронического сальпингофорита, кольпитов различной этиологии);
- для предоперационной подготовки при плановых операциях в хирургической практике с целью профилактики послеоперационных инфекционных осложнений.

**Относится к болезням:**

- [Вагинит](#)
- [Дисбактериоз](#)
- [Инфекции](#)
- [Колит](#)
- [Кольпит](#)
- [Проктит](#)
- [Реконвалесценция](#)
- [Сальпингит](#)
- [Сальпингофорит](#)
- [Токсикоз](#)
- [Энтерит](#)

**Противопоказания:**

- детский возраст (для интравагинального применения).

С осторожностью: аллергия к белкам куриного яйца (возможно применение препарата на фоне десенсибилизирующей терапии).

**Способ применения и дозы:**

Перед применением надрезают ячейковую упаковку суппозитория. Применяют препарат ректально после дефекации или после очистительной клизмы (при необходимости), интравагинально - после проведения гигиенических процедур.

При кишечных заболеваниях суппозитории применяют ректально для взрослых 3 раза в сутки по 1-2 суппозитория на прием. Продолжительность лечения при острых кишечных инфекциях составляет 7-10 дней, при затяжных и хронических формах заболевания, дисбактериозах кишечника 10-14 дней и более. Возможно применение препарата по 1 суппозиторию 2-3 раза в день в сочетании с пероральным применением препарата Бифилиз лиофилизат по 5 доз 2-3 раза в день в течение 10-14 дней, при необходимости лечение возможно продолжить до 3-х недель. Детям препарат назначают по 1 суппозиторию 2-3 раза в сутки в течение 7 дней.

В гинекологической практике: при вагинальном дисбиозе влагалища и лечении заболеваний, осложненных вагинальной патологией, препарат назначают вагинально по 1 суппозиторию 3 раза в сутки в течение 10-15 дней.

С целью профилактики послеоперационных инфекционных осложнений при плановых операциях применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней до предполагаемой операции.

**Побочное действие:**

Не выявлены.

**Передозировка:**

Случаи передозировки препарата не наблюдались.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Сведений нет.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено. Препарат можно применять одновременно с антибактериальной, противовирусной и иммуномодулирующей терапией.

**Особые указания и меры предосторожности:**

Препарат не влияет на выполнение видов деятельности требующей особого внимания и быстрых реакций (управление транспортными средствами, машинным оборудованием и т. п.).

**Условия хранения:**

Препарат хранится в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 10°C в сухом защищенном от света месте. Срок годности - 1 год.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Bifiliz\\_svechi](http://drugs.thead.ru/Bifiliz_svechi)