

[Билобил](#)



Код АТХ:

- [N06DX02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гинкго двулопастного листьев экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капсулы** желатиновые, сиренево-коричневого цвета (крышка и корпус); содержимое капсулы - порошок желтовато-коричневого цвета с видимыми частицами более темного цвета.

	1 капс.
сухой стандартизированный экстракт листьев гинкго билоба	40 мг,
с содержанием флавоновых гликозидов 24%, терпеновых лактонов 6%	

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, тальк, кремния диоксид коллоидный (безводный), магния стеарат.

Состав желатиновой капсулы: титана диоксид (E171), краситель индигодин (E132), краситель азорубин (E122), краситель железа оксид красный (E172), краситель железа оксид черный (E172), желатин.

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (6) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Ангиопротектор растительного происхождения.

Биологически активные вещества экстракта листьев гинкго билоба (флавоновые гликозиды, терпеновые лактоны) способствуют уменьшению проницаемости сосудистой стенки, препятствуют агрегации тромбоцитов. Вследствие этого улучшается микроциркуляция, снабжение головного мозга и периферических тканей кислородом и глюкозой.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Билобил не предоставлены.

Показания к применению:

Препарат назначается лицам с возрастными нарушениями мозгового кровообращения, сопровождающимися:

- расстройствами внимания и/или памяти, нарушением интеллектуальных способностей;
- чувством тревоги, страха;
- головокружением, шумом в ушах, нарушениями сна.

Назначается также в случаях нарушения кровообращения нижних конечностей.

Относится к болезням:

- [Головокружение](#)

Противопоказания:

- пониженная свертываемость крови;
- эрозивный гастрит;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;
- острые нарушения мозгового кровообращения;
- острый инфаркт миокарда;
- детский возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат следует принимать по 1 капс. 3 раза/сут. Капсулы проглатывают, запивая небольшим количеством воды.

Курс лечения - не менее 3-х месяцев. Первые признаки улучшения обычно появляются через 1 месяц.

Проведение повторного курса возможно после консультации с врачом.

Побочное действие:

Редко: кожные аллергические реакции (покраснение, кожная сыпь, отечность, зуд), диспепсия, головная боль, головокружение, бессонница, снижение свертываемости крови.

Имеются сообщения о возникновении при длительном применении препаратов гинкго билоба кровотечений у пациентов, одновременно принимавших средства, снижающие свертываемость крови.

В случае возникновения каких-либо нежелательных явлений прием препарата следует прекратить и обратиться к лечащему врачу.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Билобил не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с отсутствием достаточного количества клинических данных Билобил не рекомендуется принимать при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат не следует применять пациентам, систематически применяющим ацетилсалициловую кислоту, варфарин, тиазидные диуретики, трициклические антидепрессанты, противосудорожные препараты, гентамицин.

Особые указания и меры предосторожности:

При часто возникающих ощущениях головокружения и шума в ушах необходимо проконсультироваться с врачом.

При внезапном ухудшении или потере слуха следует немедленно обратиться к врачу.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский и подростковый возраст до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Bilobil>