

## [Билобил форте](#)



### Код АТХ:

- [N06DX02](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гинкго двулопастного листьев экстракт](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Капсулы** желатиновые, размер №4, розового цвета; содержимое капсул - порошок от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с видимыми частицами более темного цвета.

	<b>1 капс.</b>
сухой стандартизированный экстракт листьев гинкго двулопастного	80 мг

100 мг экстракта содержат 19.2 мг флавоновых гликозидов гинкго и 4.8 мг терпеновых лактонов (гинкголиды и билобалиды).

*Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, тальк, кремния оксид коллоидный безводный, магния стеарат.

*Состав оболочки капсулы:* титана диоксид (E171) - 2.5602%, азорубин (E122) - 0.0471%, железа оксид красный (E172) - 0.1756%, краситель железа оксид черный (E172) - 0.0329%, желатин.

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (6) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Препарат растительного происхождения. Повышает устойчивость организма к гипоксии, особенно тканей головного мозга, тормозит развитие травматического или токсического отека головного мозга, улучшает мозговое и периферическое кровообращение, улучшает реологию крови. Оказывает дозозависимое регулирующее влияние на сосудистую стенку, расширяет мелкие артерии, повышает тонус вен. Препятствует образованию свободных радикалов и перекисному окислению липидов клеточных мембран. Нормализует высвобождение, повторное поглощение и катаболизм нейромедиаторов (норэпинефрина, допамина, ацетилхолина) и их способность к соединению с рецепторами. Улучшает обмен веществ в органах и тканях, способствует накоплению в клетках макроэргических соединений, повышению утилизации кислорода и глюкозы, нормализации медиаторных процессов в ЦНС.

### Фармакокинетика

Фармакокинетические параметры экстракта гинкго билоба трудно поддаются оценке из-за многокомпонентного состава экстракта.

## Показания к применению:

- дисциркуляторная энцефалопатия различной этиологии (развивающаяся вследствие инсульта, черепно-мозговой травмы, в пожилом возрасте), сопровождающаяся снижением внимания, ослаблением памяти, снижением интеллектуальных способностей, нарушением сна;
- нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции (в т.ч. артериопатия нижних конечностей), синдром Рейно;
- нейросенсорные нарушения (головокружение, шум в ушах, гипоакузия);
- старческая дегенерация желтого пятна;
- диабетическая ретинопатия.

## Относится к болезням:

- [Головокружение](#)
- [Дисциркуляторная энцефалопатия](#)
- [Инсульт](#)
- [Ретинопатия](#)
- [Травмы](#)
- [Черепно-мозговая травма](#)
- [Шум в ушах](#)
- [Энцефалит](#)

## Противопоказания:

- пониженная свертываемость крови;
- эрозивный гастрит;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;
- острые нарушения мозгового кровообращения;
- острый инфаркт миокарда;
- детский возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

## **Билобил форте**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Назначают по 1 капс. 2-3 раза/сут (утром и вечером). Капсулы следует проглатывать целиком, запивая небольшим количеством воды.

Курс лечения - не менее 3 мес. Первые признаки улучшения обычно появляются через 1 мес терапии. Проведение повторного курса возможно после консультации с врачом.

### **Побочное действие:**

*Аллергические реакции:* возможно - гиперемия кожи, припухлость, кожный зуд.

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота, диарея.

*Со стороны нервной системы:* головная боль, нарушение слуха, бессонница, головокружение.

*Прочие:* понижение свертываемости крови.

### **Передозировка:**

В настоящее время о случаях передозировки препарата Билобил форте не сообщалось.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Билобил форте не рекомендуют применять при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) в связи с отсутствием достаточного количества клинических данных.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Одновременное применение препарата Билобил форте с ацетилсалициловой кислотой или антикоагулянтами (в т.ч. варфарином) может повысить риск кровотечения вследствие увеличения времени свертываемости.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

При часто возникающих ощущениях головокружения и шума в ушах необходимо проконсультироваться с врачом.

При внезапном ухудшении или потере слуха следует немедленно обратиться к врачу.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы/галактозы, при дефиците лактазы larr (лактазная недостаточность у некоторых народностей Севера).

Билобил форте содержит краситель азорубин (E122), который может вызвать развитие аллергических реакций и бронхоспазма.

В очень редких случаях азокрасители (E110, E124 и E151) могут спровоцировать развитие бронхоспазма.

#### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказано: детский и подростковый возраст до 18 лет.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

### **Срок годности:**

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Bilobil\\_forte](http://drugs.thead.ru/Bilobil_forte)