Биоспорин (лиофилизат)



Код АТХ:

- A07FA

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Бактерии, входящих в состав препарата, обладают высокой антагонистической активностью в отношении патогенных и условно патогенных микроорганизмов и не влияют на представителей нормальной микрофлоры. Синтезируют комплекс ферментов, стимулирующих и регулирующих пищеварение.

Показания к применению:

— острые кишечные инфекции, вызванных патогенными и условно патогенными микроорганизмами (Salmonella, Shigella, энтеропатогенные Escherichia coli, Proteus, Staphylococcus, Candida), в т.ч. и антибиотико-устойчивыми: при заболеваниях легкой и средней степени тяжести; при тяжелых формах у лиц с противопоказаниями к антибиотикам;

— выделение патогенных и условно патогенных микроорганизмов или дисфункция ЖКТ после перенесенных острых кишечных инфекций;

— дисбактериоз кишечника различной этиологии, в т.ч. на фоне антибиотикотерапии;

— профилактика послеоперационных инфекций, в т.ч. гнойно-септические осложнения;

— вульвовагинальный кандидоз, бактериальный вагиноз у женщин репродуктивного возраста, в т.ч. у беременных (после окончания курса антибактериальной терапии).

Относится к болезням:

- Вагинит
- Вульвит
- Дисбактериоз

- Дисбактериоз кишечника
- Инфекции
- Энтерит

Способ применения и дозы:

Внутрь, запивая кипяченой водой, за 30-40 мин до еды. Допускается размельчение таблетки.

У **детей**: для *лечения острых кишечных инфекций (в т.ч. дизентерия, сальмонеллез, пищевая токсикоинфекция)* по 1 дозе 2 раза/сут в течение 5-7 дней; при *долечивании реконвалесцентов после острых кишечных инфекций* - по 1 дозе 2 раза/сут в течение 5 дней, при необходимости курс лечения может быть увеличен до 2-х нед; при *дисбактериозе кишечника* - по 1 дозе 2 раза/сут в течение 10-14 дней; для *профилактики гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде* по 1 дозе 2 раза/сут в течение 5-7 дней до операции и в течение 10 дней после операции.

У **взрослых**: *острые кишечные инфекции* - по 2 дозы 3 раза/сут в течение 5-7 дней; при *долечивании реконвалесцентов после острых кишечных инфекций* - по 2 дозы 3 раза/сут в течение 5 дней, при необходимости курс лечения может быть увеличен до 2-х нед; при *дисбактериозе кишечника* - по 2 дозы 2 раза/сут в течение 10-14 дней; для *профилактики гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде* - по 2 дозы 2 раза/сут в течение 5-7 дней до операции и в течение 10 дней после операции; *вульвовагинальный кандидоз и бактериальный вагиноз* - по 2 дозы 2 раза/сут в течение 7-10 дней. При необходимости курс лечения может быть повторен.

Побочное действие:

Не установлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Рекламации на препарат следует направлять в ГНИИСК им. Л.А. Тарасевича и в адрес предприятия-производителя.

Применение в детском возрасте

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Источник: http://drugs.thead.ru/Biosporin_liofilizat