

## [Биоспорин \(лиофилизат\)](#)



### **Код АТХ:**

- [A07FA](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Бактерии, входящих в состав препарата, обладают высокой антагонистической активностью в отношении патогенных и условно патогенных микроорганизмов и не влияют на представителей нормальной микрофлоры. Синтезируют комплекс ферментов, стимулирующих и регулирующих пищеварение.

### **Показания к применению:**

- острые кишечные инфекции, вызванных патогенными и условно патогенными микроорганизмами (*Salmonella*, *Shigella*, энтеропатогенные *Escherichia coli*, *Proteus*, *Staphylococcus*, *Candida*), в т.ч. и антибиотико-устойчивыми: при заболеваниях легкой и средней степени тяжести; при тяжелых формах у лиц с противопоказаниями к антибиотикам;
- выделение патогенных и условно патогенных микроорганизмов или дисфункция ЖКТ после перенесенных острых кишечных инфекций;
- дисбактериоз кишечника различной этиологии, в т.ч. на фоне антибиотикотерапии;
- профилактика послеоперационных инфекций, в т.ч. гнойно-септические осложнения;
- вульвовагинальный кандидоз, бактериальный вагиноз у женщин репродуктивного возраста, в т.ч. у беременных (после окончания курса антибактериальной терапии).

### **Относится к болезням:**

- [Вагинит](#)
- [Вульвит](#)
- [Дисбактериоз](#)

## Биоспорин (лиофилизат)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

- [Дисбактериоз кишечника](#)
- [Инфекции](#)
- [Энтерит](#)

### Способ применения и дозы:

Внутрь, запивая кипяченой водой, за 30-40 мин до еды. Допускается размельчение таблетки.

**У детей:** для лечения острых кишечных инфекций (в т.ч. дизентерия, сальмонеллез, пищевая токсикоинфекция) по 1 дозе 2 раза/сут в течение 5-7 дней; при долечивании реконвалесцентов после острых кишечных инфекций - по 1 дозе 2 раза/сут в течение 5 дней, при необходимости курс лечения может быть увеличен до 2-х нед; при дисбактериозе кишечника - по 1 дозе 2 раза/сут в течение 10-14 дней; для профилактики гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде по 1 дозе 2 раза/сут в течение 5-7 дней до операции и в течение 10 дней после операции.

**У взрослых:** острые кишечные инфекции - по 2 дозы 3 раза/сут в течение 5-7 дней; при долечивании реконвалесцентов после острых кишечных инфекций - по 2 дозы 3 раза/сут в течение 5 дней, при необходимости курс лечения может быть увеличен до 2-х нед; при дисбактериозе кишечника - по 2 дозы 2 раза/сут в течение 10-14 дней; для профилактики гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде - по 2 дозы 2 раза/сут в течение 5-7 дней до операции и в течение 10 дней после операции; вульвовагинальный кандидоз и бактериальный вагиноз - по 2 дозы 2 раза/сут в течение 7-10 дней. При необходимости курс лечения может быть повторен.

### Побочное действие:

Не установлены.

### Особые указания и меры предосторожности:

Рекламации на препарат следует направлять в ГНИИСК им. Л.А. Тарасевича и в адрес предприятия-производителя.

#### **Применение в детском возрасте**

Применение возможно согласно режиму дозирования.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Biosporin\\_liofilizat](http://drugs.thead.ru/Biosporin_liofilizat)