

## Биотредин



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Пиридоксин](#)
- [Треонин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки подъязычные** белого или белого с желтоватым оттенком цвета плоскоцилиндрической формы с фаской.

	<b>1 таб.</b>
L-треонин	100 мг
пиридоксин	5 мг

**Вспомогательные вещества:** поливинилпирролидон низкомолекулярный (Повидон) 4 мг, лимонная кислота моногидрат 6.83 мг, магния стеарат 1.17 мг.

30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Биотредин является регулятором тканевого обмена, повышает умственную работоспособность, обладает лечебным эффектом при алкогольном абстинентном состоянии, уменьшает влечение к алкоголю.

L-треонин в присутствии пиридоксина (витамина B<sub>6</sub>) распадается на аминокислоту глицин и ацетальдегид, которые стимулируют процессы торможения и одновременно окислительно-восстановительные реакции, процессы дыхания и синтеза аденозинтрифосфата (АТФ) в клетках, за счет чего препарат способен:

— уменьшать психоэмоциональное напряжение;

- улучшать краткосрочную и долгосрочную память;
- повышать умственную работоспособность;
- повышать и нормализовать уровень содержания эндогенного ацетальдегида и, тем самым, уменьшить явление алкогольного абстинентного синдрома и влечение к алкоголю.

Действие Биотредина проявляется через 10-20 мин после приема под язык.

#### **Фармакокинетика**

L-треонин и пиридоксин полностью метаболизируются до конечных продуктов. Кумуляции их в организме не происходит.

### **Показания к применению:**

- детям, подросткам и взрослым при снижении умственной работоспособности и концентрации внимания;
- лицам, злоупотребляющим алкоголем, больным хроническим алкоголизмом при актуализации патологического влечения к алкоголю, сочетающегося с аффективными (раздражительность, сниженное настроение, внутренний дискомфорт), сенсорными (чувство голода) и идеаторными (мысли об алкоголе) нарушениями, при алкогольном абстинентном синдроме, а также для поддержания ремиссий.

### **Относится к болезням:**

- [Абстинентный синдром](#)
- [Алкоголизм](#)

### **Противопоказания:**

- алкогольное опьянение;
- одновременный прием лекарственных средств, угнетающих ЦНС (анксиолитиков, антипсихотических средств (нейролептиков), антидепрессантов и пр.);
- повышенная чувствительность к витамину В<sub>6</sub>.

### **Способ применения и дозы:**

Препарат назначают в таблетках под язык или в виде порошка после измельчения таблетки.

В качестве средства, повышающего внимание, умственную работоспособность: **детям, подросткам и взрослым** по 1 таб. 2-3 раза/сут в течение 3-10 дней. При необходимости курс повторяют 3-4 раза и более в год.

**Больным хроническим алкоголизмом и злоупотребляющим алкоголем** назначают по 1-3 таб. на прием 2-3 раза/сут в течение 4-5 дней. При необходимости курсы повторяют 5-10 раз в год.

При лечении **алкогольного абстинентного синдрома** назначают в первые сутки 1-4 таб. 3-4 раза/сут (суточная доза 3-16 таб.), во вторые сутки и далее по 1-2 таб. на прием 2-3 раза/сут (суточная доза 3-6 таб.) в течение 21-28 дней.

Длительность курса может укорачиваться до 10-14 дней.

Наибольший эффект Биотредина достигается при его сочетании с препаратом Глицин (таб. 100 мг). Глицин принимают под язык за 10-15 мин до приема Биотредина.

В период ремиссии для выявления скрытого влечения к алкоголю принимают 2-3 таб. Биотредина натощак. Появление в течение 10-20 минут легкого головокружения, успокаивающего эффекта, покраснения лица, потоотделения свидетельствует о наличии "скрытой тяги". В этих случаях рекомендуется 5-10 дневный курс Биотредина по 1-2 таб. 2-3 раза/сут вместе с Глицином 100 мг под язык за 10-15 мин до приема Биотредина.

### **Побочное действие:**

Возможно: головокружение, повышенное потоотделение, аллергические реакции при непереносимости витамина В<sub>6</sub>.

## **Передозировка:**

Случаев передозировки не выявлено.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Отдельных исследований не проводилось. Не рекомендуется использовать при беременности и в период лактации.

При злоупотреблении алкоголем и алкоголизме препарат может применяться при беременности и во время грудного вскармливания.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Несовместим с антипсихотическими лекарственными средствами, антидепрессантами, анксиолитиками, барбитуратами.

Ослабляет действие антипсихотических средств (нейролептиков), антидепрессантов, барбитуратов и других лекарственных средств, угнетающих ЦНС.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Не рекомендуется применять в период опьянения (т.к. снижается лечебный эффект препарата).

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 3 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Biotredin>