

## Биовиталь



### Код АТХ:

- [A11AB](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Драже** округлые, двояковыпуклые (чечевицепоподобной формы), блестящие, от темно-красного до бледно-малинового цвета.

	<b>1 драже</b>
ретинола ацетат	500 МЕ
аскорбиновая кислота	20 мг
тиамина гидрохлорид	250 мкг
рибофлавин	250 мкг
пиридоксина гидрохлорид	250 мкг
фолиевая кислота	250 мкг
цианокобаламин	0.5 мкг
никотинамид	2.5 мг
железа сульфат	50 мг,
в т.ч. железо (II)	16 мг
цитратный комплекс натрий-железо (III)	50 мг,
в т.ч. железо (III)	16.5 мг
сухой экстракт плодов боярышника (2.5-5:1)	4 мг
сухой экстракт листьев и цветков боярышника (4-7:1)	2.5 мг
сухой экстракт травы пустырника (5.5-10:1)	1 мг

*Вспомогательные вещества:* стеариловый спирт, сахароза, желатин, магния стеарат, стеариновая кислота, повидон, крахмал кукурузный, бутилгидрокситолуол, декстрозы сироп, декстрин, кремний, вода очищенная.

15 шт. - блистеры (2) - коробки картонные.

15 шт. - блистеры (4) - коробки картонные.

15 шт. - блистеры (6) - коробки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

## **Фармакологические свойства:**

### **Фармакодинамика**

Определяется комплексом входящих в состав витаминов и минералов.

## **Показания к применению:**

Применяется при профилактике и лечении гипо- и авитаминозов, дефиците железа (в т.ч. при железодефицитной анемии):

- при повышенных физических и умственных нагрузках;
- в период выздоровления после продолжительных и/или тяжело протекающих заболеваний (в т.ч. инфекционных), а также в послеоперационном периоде;
- в составе комбинированной терапии при лечении заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем (нервное перенапряжение, нарушение сна в результате перенесенного стресса).

## **Относится к болезням:**

- [Инфекции](#)

## **Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- повышенное содержание железа в организме.

*С осторожностью* следует применять у детей дошкольного возраста.

## **Способ применения и дозы:**

Препарат принимают не разжевывая, перед или одновременно с приемом пищи.

**Взрослым и подросткам** - по 1-2 драже 3 раза/сут; **детям школьного возраста** - по 1 драже 2 раза/сут.

Продолжительность лечения определяется по рекомендации врача.

## **Побочное действие:**

Аллергические реакции к компонентам препарата.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат можно принимать во время беременности и период грудного вскармливания при условии соблюдения рекомендуемой ежедневной дозы.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Железо, входящее в состав препарата, снижает всасывание тетрациклинов.

Антацидные препараты, содержащие алюминий, магний или кальций, а также колестирамин, нарушают всасывание железа.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

## **Биовиталь**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что совершенно безвредно, и объясняется присутствием рибофлавина.

Все железосодержащие препараты приводят к совершенно безвредному окрашиванию стула в черный цвет.

Не принимать одновременно другие поливитаминные препараты.

*Указания для больных сахарным диабетом:* 1 драже соответствует 0.02 ХЕ.

### **Применение в детском возрасте**

**Подростки** по 1-2 драже 3 раза/сут; **дети школьного возраста** по 1 драже 2 раза/сут.

*С осторожностью* следует применять у детей дошкольного возраста.

### **Условия хранения:**

При температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте. Не хранить во влажном месте.

Не использовать позже срока годности, указанного на упаковке.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Biovital>