

[Биовиталь Гель для детей \(Киндер Биовиталь\)](#)



Код АТХ:

- [A11AA04](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Гель пероральный для детей** светло-желтого цвета, гомогенный, вязкий, содержащий большое количество пузырьков воздуха, со слабым фруктовым (апельсиновым) запахом и кисло-сладким фруктовым (апельсиновым) вкусом.

	10 г
ретинола пальмитат	2.75 мг (5000 ME)
колекальциферол	600 ME
α-токоферола ацетат	1.65 мг
аскорбиновая кислота	100 мг
тиамина гидрохлорид	330 мкг
рибофлавин	330 мкг
кальция пантотенат	1 мг
пиридоксина гидрохлорид	1.5 мг
цианокобаламин	1 мкг
никотинамид	5 мг
кальция фосфинат	2.5 мг
марганца цитрат растворимый	6 мг
натрия молибдат	250 мкг
лецитин (фосфолипиды из бобов сои)	200 мг

Вспомогательные вещества: этанол, ароматизатор красный апельсиновый, изопропила миристат, калия сорбат, натрия бензоат, сахароза, натрия карбоксиметилцеллюлоза, ванилин, вода деминерализованная.

175 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Определяется комплексом входящих в состав витаминов и минералов.

Показания к применению:

Применяется при профилактике и лечении гипо- и авитаминозов и недостатке минеральных веществ, в т.ч.:

- при неполноценном и несбалансированном питании (диете, истощении);
- при отставании в росте;
- при воспалении слизистой оболочки полости рта (стоматите);
- в период выздоровления после продолжительных и/или тяжело протекающих заболеваний (в т.ч. инфекционных);
- в комплексном лечении при назначении антибиотикотерапии, химиотерапии;
- для профилактики рахита.

Относится к болезням:

- [Воспаление](#)
- [Инфекции](#)
- [Рахит](#)
- [Стоматит](#)

Противопоказания:

- повышенное содержание кальция в крови и моче (гиперкальциемия, гиперкальциурия).

Способ применения и дозы:

Препарат принимают: **подростки и дети школьного возраста** по 1 чайной ложке 2 раза/сут; **дети младшего и грудного возраста** по 1/2 чайной ложки 2-3 раза/сут.

Продолжительность лечения определяет врач.

При лечении поражений слизистых оболочек полости рта при стоматите рекомендуется наносить гель на слизистые оболочки и оставлять на некоторое время.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

Не принимать одновременно другие поливитаминные препараты.

Указания для больных сахарным диабетом: 5 г (1 чайная ложка) соответствует 0.15 ХЕ.

Условия хранения:

При температуре ниже 25°C, в недоступном для детей месте.

Срок годности – 2 года. Не использовать позже срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Biovital_Gel_Dlya_Detey_Kinder_Biovital?page=1