

## [Биовиталь Гель для детей \(Киндер Биовиталь\)](#)



### Код АТХ:

- [A11AA04](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Гель пероральный для детей** светло-желтого цвета, гомогенный, вязкий, содержащий большое количество пузырьков воздуха, со слабым фруктовым (апельсиновым) запахом и кисло-сладким фруктовым (апельсиновым) вкусом.

	<b>10 г</b>
ретинола пальмитат	2.75 мг (5000 МЕ)
колекальциферол	600 МЕ
α-токоферола ацетат	1.65 мг
аскорбиновая кислота	100 мг
тиамина гидрохлорид	330 мкг
рибофлавин	330 мкг
кальция пантотенат	1 мг
пиридоксина гидрохлорид	1.5 мг
цианокобаламин	1 мкг
никотинамид	5 мг
кальция фосфинат	2.5 мг
марганца цитрат растворимый	6 мг
натрия молибдат	250 мкг
лецитин (фосфолипиды из бобов сои)	200 мг

*Вспомогательные вещества:* этанол, ароматизатор красный апельсиновый, изопропила миристат, калия сорбат, натрия бензоат, сахароза, натрия карбоксиметилцеллюлоза, ванилин, вода деминерализованная.

175 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

### Фармакологические свойства:

### **Фармакодинамика**

Определяется комплексом входящих в состав витаминов и минералов.

### **Показания к применению:**

Применяется при профилактике и лечении гипо- и авитаминозов и недостатке минеральных веществ, в т.ч.:

- при неполноценном и несбалансированном питании (диете, истощении);
- при отставании в росте;
- при воспалении слизистой оболочки полости рта (стоматите);
- в период выздоровления после продолжительных и/или тяжело протекающих заболеваний (в т.ч. инфекционных);
- в комплексном лечении при назначении антибиотикотерапии, химиотерапии;
- для профилактики рахита.

### **Относится к болезням:**

- [Воспаление](#)
- [Инфекции](#)
- [Рахит](#)
- [Стоматит](#)

### **Противопоказания:**

— повышенное содержание кальция в крови и моче (гиперкальциемия, гиперкальциурия).

### **Способ применения и дозы:**

Препарат принимают: **подростки и дети школьного возраста** по 1 чайной ложке 2 раза/сут; **дети младшего и грудного возраста** по 1/2 чайной ложки 2-3 раза/сут.

Продолжительность лечения определяет врач.

При лечении поражений *слизистых оболочек полости рта при стоматите* рекомендуется наносить гель на слизистые оболочки и оставлять на некоторое время.

### **Побочное действие:**

*Возможны* аллергические реакции к компонентам препарата.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Не принимать одновременно другие поливитаминные препараты.

*Указания для больных сахарным диабетом:* 5 г (1 чайная ложка) соответствует 0.15 ХЕ.

### **Условия хранения:**

При температуре ниже 25°C, в недоступном для детей месте.

Срок годности – 2 года. Не использовать позже срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Biovital\\_Gel\\_dlya\\_detey\\_Kinder\\_Biovital](http://drugs.thead.ru/Biovital_Gel_dlya_detey_Kinder_Biovital)