

Бисакодил

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Бисакодил



Код АТХ:

- [A06AB02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бисакодил](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 30 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

Суппозитории ректальные 3 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Суппозитории ректальные 5 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Состав:

Одна таблетка содержит

Активное вещество: бисакодил 5 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 49 мг, крахмал пшеничный - 40 мг, кремния диоксид коллоидный - 1 мг, тальк - 3 мг, магния стеарат - 1 мг, желатин - 1 мг

Состав оболочки: сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата (1:1) (эудрагит L100-55) - 6.9957 мг, макрогол 6000 - 0.7 мг, краситель хинолиновый желтый 70 E104 - 0.33 мг, тальк - 1.57 мг, титана диоксид - 0.4 мг.

Один суппозиторий содержит

Активное вещество: бисакодил 10 мг

Вспомогательные вещества: глицериды полусинтетические.

Описание:

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, круглые, двояковыпуклые, желтого цвета.

Суппозитории ректальные белого или почти белого цвета с сероватым или желтоватым оттенком, торпедообразной формы, с гладкой маслянистой поверхностью.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Таблетки:

Бисакодил увеличивает секрецию слизи в толстом кишечнике, ускоряет и увеличивает его перистальтику. Действие обусловлено прямой стимуляцией нервных окончаний в слизистой оболочке толстого кишечника. При приеме внутрь всасывается из кишечника в минимальном количестве. Слабительное действие наступает обычно через 6 ч, при приеме перед сном - через 8-12 ч.

Суппозитории:

Является пролекарством. В щелочной среде происходит гидролиз с образованием вещества, оказывающего непосредственное раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки кишечника. Усиливает перистальтику, увеличивает секрецию слизи в толстом кишечнике. Действие наступает в течение первого часа после применения.

Фармакокинетика

Не всасывается в кишечнике. Является пролекарством, в щелочной среде происходит гидролиз с образованием метаболита, оказывающего раздражающее действие на слизистую оболочку желудочно-кишечный тракт.

Показания к применению:

Препарат рекомендован к применению при следующих состояниях:

- запор, обусловленный гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки (в частности, у пожилых пациентов, после операций, родов);
- регулирование стула при геморрое, проктите, анальных трещинах;
- подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

Относится к болезням:

- [Анальные трещины](#)
- [Геморрой](#)
- [Запор](#)

Противопоказания:

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже:

- кишечная непроходимость;
- ущемленная грыжа;
- острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;
- перитонит;
- кровотечения из ЖКТ;
- маточные кровотечения;
- цистит;

Бисакодил

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- спастический запор;
- острый проктит;
- острый геморрой;
- грудной возраст;
- повышенная чувствительность.

С осторожностью: применяют препарат у беременных и кормящих женщин, а также у пациентов с заболеваниями печени и почек.

Способ применения и дозы:

Таблетки:

Принимают внутрь вечером перед сном, начиная с 1 таб. При отсутствии эффекта однократную дозу увеличивают до 2-3 таб.

Детям старше 6 лет назначают по 1 таб. вечером.

При подготовке к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям назначают по 2 таб. на ночь за сутки и по 2 таб. на ночь накануне операции или исследования.

Суппозитории:

Ректально, 1 раз/сут. Суппозитории вводят глубоко в прямую кишку.

Взрослые и дети старше 14 лет - по 10-20 мг (1-2 суппозитория), детям в возрасте 8-14 лет - по 10 мг (1 суппозиторий), детям в возрасте 2-7 лет - по 5 мг (1/2 суппозитория).

В случае назначения препарата для очистки кишечника при подготовке к операции или рентгенологическому исследованию органов брюшной полости Бисакодил назначают вечером 10-20 мг (2-4 таб.) внутрь и утром 10 мг (1 суппозиторий) ректально.

Побочное действие:

Аллергические реакции, раздражение прямой кишки, кишечная колика, диарея, которая может привести к чрезмерной потере жидкости и электролитов и, следовательно, к развитию мышечной слабости, судорог, артериальной гипотензии.

Передозировка:

Симптомы: диарея, обезвоживание, нарушение водно-электролитного баланса, гипокалиемия, атония толстой кишки.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью применяют бисакодил у беременных и кормящих женщин.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном длительном применении бисакодила в больших дозах с сердечными гликозидами их действие может усилиться вследствие гипокалиемии.

Одновременный прием бисакодила с мочегонными средствами и ГКС может вызвать усиление гипокалиемии.

Особые указания и меры предосторожности:

Бисакодил

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Бисакодил не следует применять для длительного лечения хронического запора.

С осторожностью применяют бисакодил у пациентов с заболеваниями печени и почек.

Бисакодил в таблетках не применяется у детей в возрасте до 6 лет.

Условия хранения:

В сухом, прохладном и защищенном от света месте при температуре от 15 до 25°C. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Bisakodil>