Бисакодил-Акри



Код АТХ:

- A06AB02

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бисакодил

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой.

Состав:

Одна таблетка содержит

Активное вещество: бисакодил 5 мг

Вспомогательные вещества: сахар, лактоза, крахмал картофельный, тальк, кальция стеарат, матилцеллюлоза водорастворимая, готовая смесь "АКРИЛ-ИЗ" (сополимер метакриловой кислоты с этилакрилатом 1:1, титана диоксид, тальк, триэтилцитрат, кремния диоксид каллоидный безводный, натрия гидрокарбонат, натрия лаурилсульфат), хинолиновый желтый, желтый "солнечный закат".

Описание:

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, круглые, двояковыпуклые, желтого цвета. На поперечном разрезе видны два слоя.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Слабительное средство. Вызывает раздражение рецепторного аппарата кишки, оказывает непосредственное влияние на слизистую оболочку кишечника, усиливая его перистальтику и повышая секрецию слизи в тостом кишечнике.

Действие наступает через 6 ч при приеме внутрь (при приеме перед сном через 8 - 12 часов).

Фармакокинетика

Не всасывается в кишечнике. Является пролекарством, в щелочной среде происходит гидролиз с образованием метаболита, оказывающего раздражающее действие на слизистую оболочку ЖКТ.

Показания к применению:

Препарат рекомендован к применению при следующих состояниях:

— хронические запоры различной этиологии, обусловленные гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки, в т.ч. у людей пожилого возраста, у лежачих больных, в послеоперационном периоде, после родов;

— регулирование стула при геморрое, проктите, анальных трещинах;

— очищение кишечника при предоперационной подготовке, подготовка толстой кишки к инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

Относится к болезням:

- Анальные трещины
- Геморрой
- Запор
- Проктит

Противопоказания:

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже:

— гиперчувствительность;

— ущемленная грыжа;

— кишечная непроходимость;

— спастический запор;

— острый геморрой;

— острый проктит;

— острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;

— перитонит;

— боль в животе неясного генеза;

— кровотечения из ЖКТ;

— маточные кровотечения;

— цистит;

— нарушения водно-электролитного баланса;

— карцинома толстой кишки (для суппозиториев);

— детский возраст до 2 лет.

Способ применения и дозы:

Внутрь, перед сном или за 30 мин до завтрака, взрослым и детям старше 14 лет - 5-15 мг; детям 2-7 лет - 5 мг; 8-14 лет - 5-10 мг. Таблетки проглатывают, не разжевывая и запивая небольшим количеством воды. При подготовке к оперативному вмешательству, диагностическим и рентгеновским исследованиям назначают по две таблетки на ночь накануне операции или исследования.

Побочное действие:

Диспептические расстройства, метеоризм, спастические боли в эпигастрии или по всей области живота, аллергические реакции, диарея, которая может сопровождаться обезвоживанием организма и нарушением водно-электролитного баланса (мышечная слабость, судороги, снижение АД); при применении высоких доз или длительном приеме — атония кишечника; болезненные ощущения в анальной области (для суппозиториев).

Передозировка:

Симптомы: диарея, обезвоживание, нарушение водно-электролитного баланса, гипокалиемия, атония толстой кишки.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Исследований о действии препарата в период беременности и лактации не проводилось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Таблетки не следует принимать одновременно со щелочными средствами (сода, минеральные воды), молоком и антацидами (возможно преждевременное растворение оболочки таблеток и раздражение слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки). При наличии тошноты, рвоты и боли в желудке не следует принимать бисакодил внутрь.

Особые указания и меры предосторожности:

Бисакодил не следует применять длительно.

Условия хранения:

В сухом месте, при температуре не выше 25 °С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bisakodil-Akri