

[Бисакодил-Акри](#)



Код АТХ:

- [A06AB02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бисакодил](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой.

Состав:

Одна таблетка содержит

Активное вещество: бисакодил 5 мг

Вспомогательные вещества: сахар, лактоза, крахмал картофельный, тальк, кальция стеарат, метилцеллюлоза водорастворимая, готовая смесь "АКРИЛ-ИЗ" (сополимер метакриловой кислоты с этилакрилатом 1:1, титана диоксид, тальк, триэтилцитрат, кремния диоксид коллоидный безводный, натрия гидрокарбонат, натрия лаурилсульфат), хинолиновый желтый, желтый "солнечный закат".

Описание:

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, круглые, двояковыпуклые, желтого цвета. На поперечном разрезе видны два слоя.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Слабительное средство. Вызывает раздражение рецепторного аппарата кишки, оказывает непосредственное влияние на слизистую оболочку кишечника, усиливая его перистальтику и повышая секрецию слизи в толстом кишечнике.

Действие наступает через 6 ч при приеме внутрь (при приеме перед сном через 8 - 12 часов).

Фармакокинетика

Не всасывается в кишечнике. Является пролекарством, в щелочной среде происходит гидролиз с образованием метаболита, оказывающего раздражающее действие на слизистую оболочку ЖКТ.

Показания к применению:

Препарат рекомендован к применению при следующих состояниях:

- хронические запоры различной этиологии, обусловленные гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки, в т.ч. у людей пожилого возраста, у лежачих больных, в послеоперационном периоде, после родов;
- регулирование стула при геморрое, проктите, анальных трещинах;
- очищение кишечника при предоперационной подготовке, подготовка толстой кишки к инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

Относится к болезням:

- [Анальные трещины](#)
- [Геморрой](#)
- [Запор](#)
- [Проктит](#)

Противопоказания:

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже:

- гиперчувствительность;
- ущемленная грыжа;
- кишечная непроходимость;
- спастический запор;
- острый геморрой;
- острый проктит;
- острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;
- перитонит;
- боль в животе неясного генеза;
- кровотечения из ЖКТ;
- маточные кровотечения;
- цистит;

- нарушения водно-электролитного баланса;
- карцинома толстой кишки (для суппозиториев);
- детский возраст до 2 лет.

Способ применения и дозы:

Внутрь, перед сном или за 30 мин до завтрака, взрослым и детям старше 14 лет - 5-15 мг; детям 2-7 лет - 5 мг; 8-14 лет - 5-10 мг. Таблетки проглатывают, не разжевывая и запивая небольшим количеством воды. При подготовке к оперативному вмешательству, диагностическим и рентгеновским исследованиям назначают по две таблетки на ночь накануне операции или исследования.

Побочное действие:

Диспептические расстройства, метеоризм, спастические боли в эпигастрии или по всей области живота, аллергические реакции, диарея, которая может сопровождаться обезвоживанием организма и нарушением водно-электролитного баланса (мышечная слабость, судороги, снижение АД); при применении высоких доз или длительном приеме — атония кишечника; болезненные ощущения в анальной области (для суппозиториев).

Передозировка:

Симптомы: диарея, обезвоживание, нарушение водно-электролитного баланса, гипокалиемия, атония толстой кишки.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Исследований о действии препарата в период беременности и лактации не проводилось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Таблетки не следует принимать одновременно со щелочными средствами (сода, минеральные воды), молоком и антацидами (возможно преждевременное растворение оболочки таблеток и раздражение слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки). При наличии тошноты, рвоты и боли в желудке не следует принимать бисакодил внутрь.

Особые указания и меры предосторожности:

Бисакодил не следует применять длительно.

Условия хранения:

В сухом месте, при температуре не выше 25 °С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Бисакодил-Акри

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Источник: <http://drugs.thead.ru/Bisakodil-Akri>