

## [Бисакодил-Альтфарм](#)



### **Код АТХ:**

- [A06AB02](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Бисакодил](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Слабительное средство, производное дифенилметана. Повышает секрецию слизи в толстой кишке, ускоряет и усиливает его перистальтику. Действие обусловлено прямой стимуляцией нервных окончаний в слизистой оболочке толстой кишки.

#### **Фармакокинетика**

Бисакодил не абсорбируется из ЖКТ. Является пролекарством, в щелочной среде происходит гидролиз с образованием вещества, оказывающего раздражающее действие на слизистую оболочку ЖКТ.

### **Показания к применению:**

Запоры, обусловленные гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки (в частности, у пожилых пациентов; запоры после операций, родов). Регулирование стула при геморрое, проктите, анальных трещинах. Подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

### **Относится к болезням:**

- [Анальные трещины](#)
- [Геморрой](#)
- [Гипотония](#)

- [Проктит](#)

## **Противопоказания:**

Кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, боли в животе неясного генеза, перитонит, кровотечения из ЖКТ, маточные кровотечения, цистит, спастический запор, острый проктит, острый геморрой.

## **Способ применения и дозы:**

Внутрь взрослым - по 5-15 мг, детям в возрасте 8-14 лет - по 10 мг, 2-8 лет - по 5 мг. Частота приема 1 раз на ночь или утром за 30 мин до еды. Ректально взрослым - 10-20 мг; детям в возрасте 8-14 лет - по 10 мг, 2-7 лет - по 5 мг.

## **Побочное действие:**

*Со стороны системы пищеварения:* возможны коликообразные боли в области кишечника, диарея (может привести к чрезмерным потерям жидкости и электролитов и, следовательно, развитию мышечной слабости, судорог, артериальной гипотензии).

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Бисакодил применяют с осторожностью при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении возможно уменьшение концентрации дигоксина в плазме крови.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью применять у пациентов с заболеваниями печени и почек.

Не применять в течение длительного времени.

Не рекомендуется принимать одновременно с молоком и щелочной минеральной водой.

### ***При нарушениях функции почек***

С осторожностью применять у пациентов с заболеваниями почек.

### ***При нарушениях функции печени***

С осторожностью применять у пациентов с заболеваниями печени.

### ***Применение в детском возрасте***

Применение возможно с 2-х летнего возраста согласно режиму дозирования.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Bisakodil-Altfarm>