Бисакодил-Хемофарм



Код АТХ:

- A06AB02

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бисакодил

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой*** желтого цвета, круглые.

	1 таб.
бисакодил	5 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, повидон К-25, карбоксиметилкрахмал натрия, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.

Состав кишечнорастворимой оболочки: сополимер метакриловой кислоты и метилметакрилата (1:1), макрогол 6000, тальк.
Состав сахарной оболочки: сахароза, камедь акации, макрогол 6000, тальк, краситель желтый хинолиновый (Е104), титана диоксид (Е171).

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Слабительное средство. Вызывает раздражение рецепторного аппарата кишки, оказывает непосредственное влияние на слизистую оболочку кишечника, усиливая его перистальтику и повышая секрецию слизи в толстом кишечнике.

Действие наступает через 6 ч при приеме внутрь, при приеме перед сном - через 8-12 ч.

Фармакокинетика

Не всасывается в кишечнике. Является пролекарством, в щелочной среде происходит гидролиз с образованием метаболита, оказывающего раздражающее действие на слизистую оболочку ЖКТ.

Показания к применению:

— гипотонический и атонический запор (в т.ч. запоры у пожилых; запоры после операций и родов);

— регулирование стула (геморрой, проктит, трещины заднего прохода);

— подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

Относится к болезням:

- Геморрой
- Гипотония
- Запор
- Проктит

Противопоказания:

— кишечная непроходимость;

— ущемленная грыжа;

— острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;

— боли в животе неясного генеза;

— гастроэнтерит;

— аппендицит;

— перитонит;

— кровотечения из ЖКТ;

— метроррагия;

— цистит;

— спастические запоры;

— острый проктит;

— острый геморрой;

— детский возраст до 3-х лет.

— повышенная чувствительность.

С *осторожностью:* беременность, период лактации, печеночная и/или почечная недостаточность.

Способ применения и дозы:

Таблетки принимают внутрь 1 раз/сут перед сном или за 30 мин до завтрака.

Взрослым и детям старше 14 лет препарат назначают по 1-3 таб. (5-15 мг) на прием.

Детям в возрасте 8-14 лет - по 1-2 таб. (5-10 мг), **детям в возрасте от 3-х до 7 лет** - 1 таб. (5 мг).

При *подготовке к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям* назначают по 2 таб. на ночь за сутки до исследования и по 2 таб. на ночь накануне операции или исследования.

Таблетки проглатывают целиком, не разламывая, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.

Побочное действие:

Возможны: кишечная колика, диарея (дегидратация, нарушение водно-электролитного обмена, мышечная слабость, судороги, снижение АД), абдоминальные боли, метеоризм, аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: диарея, обезвоживание, нарушение водно-электролитного баланса, гипокалиемия, атония толстой кишки.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью: беременность, период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Совместное применение с антацидами может привести к преждевременному растворению его оболочки и раздражению желудка и двенадцатиперстной кишки.

Не рекомендуется принимать одновременно с молоком и щелочной минеральной водой.

Особые указания и меры предосторожности:

Бисакодил не следует назначать при лечении хронического запора в течение длительного времени (более 10 дней).

Если при применении бисакодила начнется кровотечение из прямой кишки, следует предупредить больного о прекращении приема препарата.

В результате применения препарата возможно фиолетовое окрашивание мочи и кала.

При нарушениях функции почек

С *осторожностью:* почечная недостаточность.

При нарушениях функции печени

С *осторожностью:* печеночная недостаточность.

Применение в детском возрасте

Детям в возрасте 8-14 лет - по 1-2 таб. (5-10 мг), **детям в возрасте от 3-х до 7 лет** - 1 таб. (5 мг).

Детям до 3-х лет препарат противопоказан.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15° до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bisakodil-Hemofarm